

## RESULTADOS

### Características sociodemográficas

De los 485 estudiantes encuestados en la delegación Venustiano Carranza, el 47% pertenece al sexo masculino y el 53% al sexo femenino. En la distribución por grupos de edad se observa que el 53.2% tiene 14 años o menos.

El 53.8% de la muestra se ubica en el nivel secundaria, el 25.4% en el nivel bachillerato y el 20.8% en escuelas técnicas.


Además, cuatro de cada cien estudiantes encuestados había dejado los estudios el año anterior a la encuesta y diez de cada cien trabajó tiempo completo durante el mismo período.

### Prevalencia de consumo de drogas


El tabaco y las bebidas alcohólicas son las sustancias más consumidas por los estudiantes encuestados, a pesar de que el 86.8% de ellos son menores de edad y la venta de estos productos les está prohibida.

### Tabaco

El 56.3% de los estudiantes encuestados han fumado tabaco alguna vez. Este porcentaje es mayor al observado en todo el Distrito Federal (50.6%) (Gráfica 1).




Los índices de uso son menores entre los varones con relación a las mujeres (54.8% y 57.6% respectivamente) (Gráfica 2).





El consumo se incrementa con la edad, el 34.1% de los estudiantes de 13 años o menos reporta haber fumado. En tanto, esta conducta se observa en el 74.8% de los jóvenes de 17 años o más.

El porcentaje más alto de consumo de tabaco de esta delegación se ubica en los bachilleratos (71.5%) y las escuelas técnicas (67.3%). En tanto, en las escuelas secundarias el consumo es de 44.8% ([Gráfica 3](#)).



El consumo de tabaco es más dto entre aquellos adolescentes que no asistieron a la escuela (90%) y entre aquellos que habían trabajado medio tiempo (66.7%) el año anterior al estudio ([Gráfica 4](#) y [Gráfica 5](#)).






### Bebidas alcohólicas

El 71.5% de los estudiantes de esta delegación han consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión, el 49.9% lo ha hecho en el último año, el 39% las ha consumido en el mes anterior al estudio y el 24.9% ha consumido por lo menos en una sola ocasión en el último mes 5 copas o más (abuso de alcohol). Estos datos reflejan un mayor consumo en los cuatro tipos de prevalencias para la delegación Venustiano Carranza con relación a los resultados observados en el Distrito Federal (65.8%, 45.9%, 35.2% y 23.8% respectivamente) (Gráfica 6).



El uso experimental de alcohol es mayor en las mujeres que en los hombres (72.8% y 70.2%). También en el consumo del último año las mujeres han consumido más que los hombres (51.4% y 48.2%). En cambio, estas diferencias se invierten para el abuso de alcohol (Gráfica 7).

Los índices de experimentación se incrementan con relación a la edad. El 62% de los estudiantes menores de 14 años reporta haber ingerido bebidas alcohólicas. En tanto, el 89.1% de los adolescentes mayores de 18 años señala haber consumido alcohol. Esta misma tendencia se observa para el consumo en el último año y en el último mes.






El índice más alto de consumo en el último mes se observa en los bachilleratos (50.4%), seguidos por las escuelas técnicas (47.5%) y las secundarias (30.3%).

El consumo de alcohol es más alto entre los que estudiaron medio tiempo (84.2%), los que no estudiaron (80%) y entre los que trabajaron medio tiempo en el año previo a la encuesta (79.6%).

Con relación a la cantidad de consumo, el 4.5% de los estudiantes encuestados reporta consumir cinco copas o más en una sola ocasión una o más veces en la última semana y el 9.9% señala haberlo hecho una vez en el último mes.

En cuanto al tipo de bebidas alcohólicas, tanto los hombres como las mujeres prefieren en primer término la cerveza (55.7% y 47.5%). En segundo lugar, las bebidas preparadas (44.7% y 45.9%) y en tercer lugar, los coolers (42.5% y 45.1%) (Gráfica 8, Gráfica 9 y Gráfica 10).






### Prevalencias y tendencias del consumo de drogas ilegales


Los estudiantes entrevistados en esta delegación han experimentado más frecuentemente con dos tipos de drogas: marihuana (9.3%) e inhalables (6.6%). La siguiente droga de preferencia es la cocaína (5.2%).

Con relación a las tres prevalencias, se observa que esta delegación tiene mayor consumo de marihuana, cocaína e inhalables con respecto al resto del Distrito Federal ([Gráfica 11](#)).



Los índices de experimentación son más altos en los hombres con relación a las mujeres, de manera que por cada catorce hombres que experimentan con marihuana, cinco mujeres la han probado. En el caso de los inhalables esta relación es de nueve hombres por cada cinco mujeres.

Los índices de consumo muestran un marcado aumento conforme incrementa la edad de los usuarios. Por ejemplo, el 6.1% de los menores de 16 años reporta haber probado la marihuana, pero esto ocurre en el 14.9% de los adolescentes con 16 años o más. El consumo de cocaína es de 1.9% en menores de 16 años y de 10.9% en los de 16 años o más. Lo mismo ocurre con los inhalables, donde los porcentajes son 5.5% y 8.6%, respectivamente ([Gráfica 12](#)).



Al observar las tendencias en las prevalencias de consumo en el último año, entre las encuestas de 1993 al 2003, que tienen metodologías similares, para los hombres se encuentra que el consumo de marihuana, cocaína e inhalables ha incrementado. El mayor aumento se presenta para la marihuana (2.4% a 8.8%).

Para las mujeres, el consumo de marihuana y de inhalables ha aumentado, en tanto que el de cocaína se presenta en forma similar ([Cuadro 1](#)).

**Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales**

	Alguna Vez			
	1993 %	1997 %	2000 %	2003 %
<b>Hombres</b>				
Mariguana	5.6	10.3	6.0	14.0
Cocaína	1.3	9.1	5.6	8.8
Alucinógenos	.9	2.9	.4	3.1
Inhalables	8.1	6.3	3.2	8.8
Heroína	.4	.6	1.2	3.1
<b>Mujeres</b>				
Mariguana	2.0	1.8	2.9	5.1
Cocaína	.8	2.7	3.2	1.9
Alucinógenos	.4	1.3	.6	1.6
Inhalables	3.4	2.2	2.3	4.7
Heroína	.4	.9	-	.4
	Último Año			
<b>Hombres</b>				
Mariguana	2.1	6.3	2.4	8.8
Cocaína	.4	6.3	4.0	5.3
Alucinógenos	-	1.1	.4	1.8
Inhalables	1.3	4.0	1.2	6.6
Heroína	.4	.6	.8	2.6
<b>Mujeres</b>				
Mariguana	1.6	1.3	1.0	1.9
Cocaína	-	1.8	.6	.8
Alucinógenos	-	.9	.3	-
Inhalables	.8	1.3	1.0	3.1
Heroína	-	.4	-	.4
	Último mes			
<b>Hombres</b>				
Mariguana	2.1	2.3	.8	4.4
Cocaína	.4	3.4	1.6	3.1
Alucinógenos	-	1.1	-	1.3
Inhalables	1.3	2.3	1.2	3.1
Heroína	.4	-	.4	1.8
<b>Mujeres</b>				
Mariguana	1.6	.9	1.0	.4
Cocaína	-	.9	.3	.4
Alucinógenos	-	.4	-	-
Inhalables	.8	-	.3	1.6
Heroína	-	-	-	.4

Fuente 1993: Medina-Mora, M.E.; Berenzon, S.; Carreño, S.; Juárez, F.; Rojas, E.; Villatoro, J.; Cardiel, H.; Breña, J. (1994). **Encuesta sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, 1993: Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**. SEP, IMP. México. Fuente 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**, SEP, IMP, México. Fuente 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**. INP-SEP. México.

### Prevalencias y tendencias de drogas médicas

En cuanto a la distribución por género, los hombres tienen menor consumo de tranquilizantes (3.9% por 6.2%) y un mayor consumo de anfetaminas (4.4% por 2.7%).

En cuanto a las tendencias del consumo, en los hombres se encuentra un incremento en el consumo de anfetaminas y un decremento en el de tranquilizantes. Para las mujeres, el incremento se presenta en ambas sustancias (Cuadro 2).

Cuadro 2: Consumo de Drogas Médicas

	Alguna Vez		
	1997 %	2000 %	2003 %
<b>Hombres</b>			
Anfetaminas	2.3	2.8	4.4
Tranquilizantes	2.9	4.8	3.9
Sedantes	-	.4	.4
<b>Mujeres</b>			
Anfetaminas	.9	1.6	2.7
Tranquilizantes	5.8	5.5	6.2
Sedantes	1.3	1.3	1.6
	Ultimo Año		
<b>Hombres</b>			
Anfetaminas	1.1	.4	2.6
Tranquilizantes	1.1	2.8	2.2
Sedantes	-	-	-
<b>Mujeres</b>			
Anfetaminas	.9	1.0	1.9
Tranquilizantes	4.9	2.9	3.9
Sedantes	1.3	.3	.8
	Ultimo mes		
<b>Hombres</b>			
Anfetaminas	-	-	1.3
Tranquilizantes	-	.4	.9
Sedantes	-	-	-
<b>Mujeres</b>			
Anfetaminas	.9	.6	1.2
Tranquilizantes	2.7	1.9	1.9
Sedantes	.4	-	.8


Fuente 1997: Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cardiel, H., Alcántar, E., Fleiz, C., Navarro, C., Blanco, J., Parra, J. y Néquiz, G. (1999). **Consumo de drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 1997. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**, SEP, IMP, México. Fuente 2000: Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Villa, G., Jasso, A., Alcántar, M.I., Bermúdez, P., Castro, P., Blanco, J. (2001). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal: medición otoño 2000. Reporte de la Delegación Venustiano Carranza**. INP-SEP. México.

### Variables asociadas al consumo

#### Tolerancia social hacia el consumo de sustancias


En general, los maestros muestran poca tolerancia social ante el consumo de sustancias. El 63.1% de los estudiantes indica que sus maestros verían muy mal si ellos fumarán. En tanto, el 74.3% señala que verían muy mal si consumieran alcohol, y para el consumo de drogas se percibe aún menor tolerancia por parte de los maestros, ya que el 87.1% de los adolescentes así lo reporta.


Estos datos varían bastante cuando el referente de la tolerancia social son los propios compañeros del adolescente. En el caso de alcohol y tabaco el 54.8% y el 47.4% respectivamente de los adolescentes, reporta que sus compañeros verían muy mal estas conductas. En el caso de las drogas este valor es mayor (80.9%), aunque sigue siendo bajo con relación a lo que perciben de sus maestros [Gráfica 13](#). También, cabe mencionar que las mujeres en general reportan porcentajes más altos de poca tolerancia social ante el consumo de estas sustancias.



#### Percepción de riesgo asociado con el consumo

Un aspecto que protege a los estudiantes con relación al consumo de sustancias, es el riesgo percibido asociado al consumo. Los resultados del estudio indican que los adolescentes perciben dicho riesgo como alto. De manera que más del 62.1% reporta que es muy peligroso el uso de la marihuana, cocaína, heroína o de los inhalables. En tanto, más del 40.6% indica como muy peligroso fumar 5 ó más cigarrillos diarios, más del 70.2% indica que es muy peligroso fumar 1 cajetilla o más al día, y más del 43.5% lo indica para consumir frecuentemente alcohol (Gráfica 14 y Gráfica 15).





## CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la delegación Venustiano Carranza, el índice de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas por parte de la población estudiantil es alto.

La delegación Venustiano Carranza se caracteriza por tener un consumo de alcohol y tabaco más alto (71.5% y 56.3% respectivamente) en comparación con el D.F. (65.8% y 50.6% respectivamente).

Los resultados de esta encuesta muestran que el consumo de tabaco en hombres y mujeres se ha mantenido en niveles más elevados para las mujeres tanto en la encuesta del 2000 como en la del 2003, ya que en anteriores estudios los índices de consumo eran mayores por parte de la población masculina. En las dos últimas encuestas la delegación Venustiano Carranza muestra que en las mujeres se presenta un mayor consumo de esta sustancia en comparación con los varones (51% y 44% respectivamente en el 2000; y en el 2003, 57.6% y 54.8% respectivamente).

El tipo de bebida alcohólica preferida por los estudiantes de ambos sexos es la cerveza, seguida por las bebidas preparadas y los coolers.

Estos datos reflejan que el consumo de alcohol y tabaco es elevado, a pesar de que las leyes prohíben su venta a menores de 18 años, que es la mayor parte de la población de este estudio.

Adicionalmente a esto, las drogas que consumen con mayor frecuencia los estudiantes son la marihuana, los inhalables y en tercer lugar la cocaína.

En lo que se refiere a las tendencias del 2000 al 2003 en el consumo el último de drogas ilegales, las prevalencias han incrementado en marihuana, cocaína e inhalables para los hombres, siendo el mayor aumento para la marihuana, que pasó del 2.4% a 8.8%. En las mujeres, el aumento se presenta para el consumo de marihuana y de inhalables.

Es importante señalar las comparaciones de las encuestas realizadas en 2000 y 2003, ya que se observan cambios en el consumo de drogas médicas, siendo que el uso de anfetaminas tuvo un incremento y el de tranquilizantes un decremento por parte de los hombres; mientras que en las mujeres se presentó un aumento en el consumo de ambas sustancias.

La tolerancia social que demuestran los maestros frente al consumo de drogas es muy baja, lo cual indica que esta práctica no es aceptada. Esta falta de aceptación puede funcionar como un factor de protección ante el uso de sustancias psicoactivas. Por ello es recomendable ampliar la influencia protectora de la escuela, de manera que se promueva la participación de los alumnos en actividades deportivas y culturales, lo que contribuirá a dar una gama de opciones saludables para que el adolescente invierta su tiempo en ellas y esto contribuya también a una mejor comunicación con su familia.

La percepción de riesgo es baja y la tolerancia social es alta en relación con el consumo de alcohol y tabaco. En cuanto al consumo de drogas, la situación es al revés; los estudiantes tienen una mayor percepción de riesgo de consumir drogas y una menor tolerancia social al consumo de drogas. Sin embargo, la percepción de riesgo en relación con la marihuana ha disminuido desde 1993, lo cual coincide con el incremento en el consumo de esta sustancia.

En general, los datos señalan la importancia de planear programas preventivos para evitar que el consumo de sustancias psicoactivas se siga extendiendo en nuestra población. Aparte de informar y orientar a los estudiantes sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que el consumo y abuso les acarrea, es importante establecer una relación más estrecha con nuestros adolescentes, que permita conocer mejor sus necesidades y sus concepciones sobre el mundo que les rodea.

La tarea no es sencilla, debido a que es necesario reforzar nuestros valores, normas y estilos de vida en una sociedad que ha cambiado mucho y que presenta una problemática importante de desorganización social y de alta criminalidad, por lo cual es importante diseñar nuevos instrumentos de prevención y reforzar los ya existentes, con nuevas ideas que los enriquezcan.

Adicionalmente, la cobertura de estos programas debe iniciarse con los niños por lo menos al inicio de la educación preescolar, incluyendo a sus padres. Es importante reconocer que es en esa época cuando la comunicación y el vínculo padres-hijo es más fuerte y más fácil de establecer. Además, en ella se pueden establecer lazos fuertes que protejan al niño cuando inicie la búsqueda de su propia identidad en la que incluirá a su familia y a los valores que en ella se han establecido.

**Favor de citar el presente documento de la siguiente forma:**

Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). **Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación V. Carranza.** INP-SEP. México.