



# Encuesta Nacional de Adicciones 2008

Resultados por entidad federativa

**SALUD**

## Sinaloa





---

Encuesta Nacional de Adicciones 2008  
**Resultados por entidad federativa, Sinaloa**

---



Encuesta Nacional  
de **Adicciones**  
**2008**

Resultados por entidad federativa

**Sinaloa**

Encuesta Nacional de Adicciones 2008, **Resultados por entidad federativa, Sinaloa**  
Primera edición, 2009

D.R. © Instituto Nacional de Salud Pública  
Av. Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatlán  
62508 Cuernavaca, Morelos, México

Impreso y hecho en México  
*Printed and made in Mexico*

ISBN: 978-607-7530-45-9

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 es un esfuerzo de la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, en el cual participaron el Instituto Nacional de Salud Pública, que fue responsable del operativo de campo y del diseño conceptual e interpretación de los datos de tabaco, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que tuvo a su cargo el diseño del cuestionario, la capacitación de los encuestadores, la supervisión de campo, el diseño conceptual y el análisis de las secciones de drogas y alcohol.

La encuesta se realizó con apoyo financiero de la Secretaría de Salud, así como con financiamiento adicional de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Embajada de los Estados Unidos para la supervisión de campo y análisis de datos.

---

# Encuesta Nacional de Adicciones 2008

---

## Coordinación general

Carlos Rodríguez Ajenjo  
Consejo Nacional contra las Adicciones

## Coordinación técnica

Jorge A. Villatoro Velázquez  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Coordinación logística

Martha María Téllez-Rojo  
Claudia Díaz Olavarrieta  
Laura Mendoza Alvarado  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Diseño conceptual

Carlos Rodríguez Ajenjo  
Consejo Nacional contra las Adicciones  
  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Jorge A. Villatoro Velázquez  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Diseño conceptual sección de tabaco

Eduardo Lazcano  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Diseño logístico

Juan Pablo Gutiérrez  
Manuel Castro Tinoco  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Diseño y control muestral

Oswaldo Palma Coca  
Isaac Sidhartha Salcedo Campos  
Alaín López Condado  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Capacitación general drogas y alcohol

Clara Fleiz Bautista  
Jorge A. Villatoro Velázquez  
Francisco Juárez García  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Supervisión de práctica de capacitación

Ma. de Lourdes Gutiérrez López  
Midiam Moreno López  
Michelle Bretón Cirett  
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores  
Vianney Sánchez Pineda  
Elsa Nancy Magaña Méndez  
Mitzi Roxana Razo Guzmán  
Miguel Ángel López Brambila  
María Estela Rojas Guiot  
Lianed Gaytán López  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

## Levantamiento de campo

Juan Pablo Gutiérrez  
Manuel Castro Tinoco  
Instituto Nacional de Salud Pública

## Supervisión de trabajo de campo

Clara Fleiz Bautista  
Vianney Sánchez Pineda  
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores  
Elsa Nancy Magaña Méndez  
Mitzi Roxana Razo Guzmán  
Miguel Ángel López Brambila  
Michelle Bretón Cirett  
Midiam Moreno López  
María Estela Rojas Guiot  
Lianed Gaytán López  
Jorge A. Villatoro Velázquez  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

#### **Desarrollo de sistemas y bases de datos**

Oswaldo Palma Coca  
Alaín López Condado  
Daniel Acosta Vargas  
Francisco Javier Carlos Rivera  
Isaac Sidhartha Salcedo Campos  
Claudia Irene Larracilla Camacho  
Instituto Nacional de Salud Pública

#### **Análisis estadístico de drogas y alcohol**

Jorge A. Villatoro Velázquez  
Ma. de Lourdes Gutiérrez López  
Midiam Moreno López  
Jerónimo Blanco Jaimés  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

#### **Elaboración del reporte de drogas y alcohol**

Jorge A. Villatoro Velázquez  
María Elena Medina-Mora Icaza  
Clara Fleiz Bautista  
Patricia Cravioto  
Ma. de Lourdes Gutiérrez López  
Midiam Moreno López  
Nieves Quiroz del Valle  
Mario Cortés  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Carlos Rodríguez Ajenjo  
Consejo Nacional contra las Adicciones

#### **Elaboración del reporte de tabaco**

Eduardo Lazcano  
Instituto Nacional de Salud Pública

#### **Reporte metodológico**

Martha María Téllez-Rojo  
Claudia Díaz Olavarrieta  
Juan Pablo Gutiérrez  
Oswaldo Palma Coca  
Instituto Nacional de Salud Pública

#### **Clasificación de sustancias psicoactivas**

Mario Gómez  
Arturo Ortiz  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

#### **Consejo asesor**

Guilherme Borges Guimaraes  
Guillermina Natera Rey  
Patricia Cravioto  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Rafael Lozano  
Patricia Nilda Soliz  
Dirección General de Información en Salud

Víctor Guiza  
Ricardo Sánchez Huesca  
Centros de Integración Juvenil

Carlos Magis  
CENSIDA



# Contenido

<b>Prólogo</b>	<b>11</b>
<b>Presentación</b>	<b>13</b>
<b>Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en Sinaloa</b>	<b>15</b>
<b>Método</b>	<b>17</b>
<b>Tabaco</b>	<b>23</b>
Principales resultados	24
Conclusiones	30
<b>Drogas</b>	<b>31</b>
Principales resultados	32
Conclusiones	34
<b>Alcohol</b>	<b>35</b>
Principales resultados	36
Conclusiones	37
<b>Referencias</b>	<b>40</b>
<b>Glosario</b>	<b>41</b>
<b>Anexos</b>	<b>45</b>
A. Drogas	46
Resultados del estado	46
Intervalos de confianza	59
B. Alcohol	<b>63</b>
Resultados estatales	63
Intervalos de confianza	69
C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas	70



La información confiable y oportuna es una de las herramientas más valiosas para la toma de decisiones, el diseño de programas y políticas públicas de atención y prevención y de apoyo en la definición de la normativa en materia de salud. En ella se apoya de manera sustantiva la gestión estratégica que busca atender de manera efectiva los problemas de salud de los mexicanos.

En la actualidad las adicciones son una prioridad a nivel global y nacional, que por su magnitud y consecuencias nos requiere estar bien informados para poder dirigir de manera precisa y contundente nuestros recursos y esfuerzos.

Las encuestas nacionales son una metodología muy útil a este fin y México tiene amplia experiencia en su realización, un ejemplo son las encuestas nacionales de adicciones (ENA) que se vienen realizando desde 1988, de las cuales la quinta y más reciente, la ENA 2008, se realizó entre los años 2007 y 2008. En ella destaca su diseño probabilístico polietápico, que ha permitido la representatividad nacional, urbano-rural, regional y ahora por entidad federativa. Luego de presentar el reporte de la ENA 2008 con los datos nacionales, establecimos el compromiso de difundir en breve las estadísticas estatales, que por primera ocasión permitirán conocer en forma específica para cada estado el comportamiento de las adicciones.

Con las ENA hemos podido conocer más acerca de la magnitud y distribución de las adicciones; identificar algunas variables a las cuales se asocian más frecuentemente; generar hipótesis de investigación; contribuir en el conocimiento de su historia natural, así como evaluar medidas de control y detectar cambios en las prácticas médicas y de salud.

Estoy plenamente convencido de que el esfuerzo quedaría inacabado si la información generada en la Encuesta no llega a las manos de los gestores a nivel local y de los ciudadanos en general, en donde se vive de manera inmediata esta problemática. Tenemos la obligación de difundirla de manera que sirva para construir nuevos conocimientos que deban utilizarse no sólo para comprender y predecir, sino para modificar políticas, estrategias, programas y comportamientos, y como mecanismo para la movilización social de voluntades, recursos y la generación de compromisos. Ante la evidencia confiable, no existe duda.

A nivel nacional, la ENA 2008 muestra que el problema más importante en adicciones en México está en el abuso del consumo de

bebidas alcohólicas, con las graves consecuencias familiares, sociales y comunitarias, y en el uso de tabaco, arraigados ambos en muchas poblaciones, tanto rurales como urbanas, y que está cobrando víctimas en los jóvenes que se inician en su consumo a edades cada vez más tempranas.

En el caso de las drogas ilegales, en México se ha generado un mercado de consumidores similar al de algunos países europeos y de otros como Perú o Colombia, originando un daño cada vez mayor, tanto a la salud como a la armonía social y a la gobernabilidad. Las cifras muestran que cada vez existe mayor exposición al consumo y es mayor la facilidad con la que se consiguen las drogas entre los jóvenes.

Los resultados que presentamos para las 32 entidades federativas muestran que las adicciones son un problema generalizado, con sus especificidades dependiendo de variables como tipo de droga, intensidad, edad, sexo, residencia, etc., y que se deben tener presentes.

En general se destaca, en cuanto al consumo de tabaco, que 20.4% de la población urbana entre los 12 y los 65 años de edad son fumadores activos, en tanto que en las localidades rurales la proporción es de 11.3 por ciento. Para el caso del consumo de alcohol, fueron los estados del centro-occidente los de alto consumo, donde se ubican Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.

Para el consumo de drogas ilegales y médicas, los datos de la medición mostraron que dos estados fronterizos tienen el mayor consumo, Quintana Roo en el sur y Tamaulipas en el norte, con una incidencia de 11.2 y 11.1 por ciento. Junto con ellos se ubican 12 entidades federativas más que registraron una incidencia acumulada de cualquier clase de droga, en población rural y urbana entre los 12 y los 65 años de edad, por arriba de los intervalos de confianza de la prevalencia nacional.

De esta manera ponemos a disposición de la sociedad en general la información estatal de la ENA 2008, la cual es parte del esfuerzo sistematizado que la administración federal, a cargo del C. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, está realizando, en coordinación con los gobiernos estatales, para enfrentar el problema de quienes consumen, abusan o ya dependen de las drogas, y disminuir sus graves consecuencias a través de la aplicación de políticas públicas claras, consistentes y de largo plazo, que integran en una acción sinérgica todos los recursos disponibles de las institu-

ciones y están siendo una gran oportunidad para una responsabilidad social compartida, entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada y los ciudadanos.

La realización de la ENA 2008, coordinada por la Secretaría de Salud, fue posible gracias a la participación y compromiso de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, del Consejo Nacional contra las Adicciones, y a la colaboración de otras instancias como el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Reconozco de la misma manera el destacado apoyo recibido por parte de las entidades federativas, organizaciones y personas que hicie-

ron posible la realización de la Encuesta, a los que han contribuido a su financiamiento y a los que difunden los resultados derivados de ella.

Las bases de datos estarán también disponibles para la sociedad en general, los tomadores de decisiones, los académicos, los investigadores, etc., esperando que el dato se convierta en conocimiento transformador, como lo expresara Sócrates hace ya muchos años: "Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores".

Dr. José Ángel Córdova Villalobos  
Secretario de Salud

# Presentación

**E**n nuestro actual entorno social, el consumo de drogas juega un papel muy importante. Debido a ello, los esfuerzos de prevención deben enfocarse a fortalecer a los adolescentes y jóvenes en riesgo de consumo con el desarrollo de habilidades (comunicación, resolución de conflictos, etc.). El Programa Nacional de Salud 2007-2012, en su búsqueda por mejorar las condiciones de salud de la población, tiene entre sus principales objetivos disminuir los niveles de consumo de drogas en la población, en donde los adolescentes y jóvenes tienen prioridad. Para el cumplimiento de esta tarea, se tiene el Programa contra las Adicciones, que integrado a las acciones de Promoción de la Salud y Prevención y Atención de las Enfermedades, constituye una respuesta sin precedentes para revertir los crecientes índices de prevalencia de problemas de adicción.

El fenómeno del consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas legales o ilegales muestra una preocupante evolución. Sus principales indicadores revelan un incremento de las prevalencias de consumo, así como una disminución en las edades de inicio, principalmente para las drogas introductorias como el tabaco y el alcohol. Una de las metodologías más útiles para observar la evolución de este fenómeno es la realización de estudios transversales con encuestas de hogares que se realizan con periodicidad fijada de manera convencional en muestras representativas nacionales. Esto se ha venido desarrollando a través de la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones en sus versiones anteriores.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008) se realizó en hogares y, además de los valiosos resultados sobre el consumo y las actitudes de la población ante los diversos tipos de drogas, permite tener datos comparativos de dos ciclos de 10 años cada uno (1988-1998-2008), es decir, cuatro lustros de estudio del problema en los que se realizaron cinco encuestas mediante las que es posible observar con mejor precisión las modificaciones en las prevalencias nacionales. Por lo tanto, la ENA 2008 nos brinda información esencial para observar cómo evoluciona el proceso, para saber qué sustancias son las más utilizadas y por quién, a fin de planificar adecuadamente los programas y las acciones que en materia de adicciones debe realizar el gobierno en tanto autoridad rectora en la materia. Hay que resaltar que, debido al tipo de información que recoge, el desarrollo de esta Encuesta se topó con una serie de dificultades para su levantamiento, finalmente resueltas para poder alcanzar los resultados en el ámbito estatal que aquí se engloban.

En lo relacionado con el consumo de drogas, la ENA 2008 presenta un escenario de salud pública donde en los grupos de 12 a 17 años es comparativamente mayor (hasta en 30%) la exposición a la

oportunidad de consumirlas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha crecido en los últimos seis años hasta cerca de 50 por ciento. Asimismo, la edad de inicio del consumo de drogas se ha adelantado hasta los 18 y 20 años, respectivamente, para hombres y mujeres, y estas últimas duplicaron su participación en el consumo. La Encuesta ha logrado identificar las seis principales sustancias adictivas de mayor consumo en la población y que la oferta de sustancias que ha invadido al país se ha elevado considerablemente. El principal beneficio que los tomadores de decisiones obtienen con los datos que proporciona la ENA 2008 es que, en el escenario de la política de salud, la prevención, la detección oportuna y las intervenciones breves son las acciones que han demostrado ser más costo-efectivas para enfrentar el complejo problema de las adicciones.

La principal diferencia entre las encuestas anteriores y esta quinta consiste en la representatividad estatal, lo que permitirá a los estados iniciar un proceso de medición; es decir, un seguimiento de la prevalencia del consumo en la población al interior de cada entidad con base en un conteo metodológico bien estructurado.

La serie de resultados estatales de la ENA 2008 abre una nueva perspectiva en la salud pública y la epidemiología de las adicciones en cada una de las 32 entidades federativas del país. Además de que hoy se cuenta con información que permite supervisar y tomar decisiones en el ámbito estatal, se cubre un vacío de información que era necesaria para la instrumentación de acciones de intervención, prevención y promoción de ambientes saludables. De igual modo, la información que se incluye constituye una referencia básica para el desarrollo de programas de intervención adecuados a las necesidades de cada entidad federativa.

Contar con este tipo de herramientas metodológicas plantea también un reto a los sistemas de salud estatales, ya que éstas se convierten en el observatorio que mide, si bien transversalmente, los éxitos en la lucha contra el consumo de drogas. Igualmente se constituyen en el elemento básico para el tomador de decisiones en el proceso de evaluación. Los resultados por entidad federativa de la ENA 2008 son una contribución más al conocimiento en salud y se convierten en parte de la rendición de cuentas que hoy es compromiso fundamental del trabajo en salud pública, especialmente en lo referente al combate contra el abuso de las drogas.

Dr. Mauricio Hernández Ávila  
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud  
Secretaría de Salud



# Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en Sinaloa

**N**uestro país cuenta con una amplia experiencia acumulada en la investigación de corte epidemiológica y psicosocial sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco. Estas investigaciones se han llevado a cabo continuamente desde la década de los setentas con una misma metodología utilizando técnicas de recolección y análisis uniformes para cada tipo de población estudiada, lo cual ha permitido conocer el panorama global que guarda dicho fenómeno en distintos escenarios, entre los cuales se encuentran los hogares, las escuelas y los centros de tratamiento. Asimismo, a través de estos esfuerzos en investigación se han identificado, en estos escenarios, los patrones de consumo, los grupos más vulnerables, las tendencias a lo largo del tiempo, las características sociodemográficas más importantes que predicen o protegen de dicho consumo, entre otros aspectos relevantes relacionados con el ámbito social de las adicciones (anexo C).

Es importante destacar que con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, por primera vez se cuenta con un informe para cada Estado de la República, además de un reporte nacional para población rural y urbana de 12 a 65 años. En las encuestas nacionales previas (ENA 1988, 1993, 1998, 2002),<sup>1-4</sup> se obtuvieron datos regionales y a nivel nacional; en las encuestas de 1988, 1993 y 1998 se obtuvieron datos con población urbana, y con la encuesta del 2002 se tuvieron datos para población rural y urbana.

En el caso específico del Estado de Sinaloa, se tienen pocos antecedentes estatales en las encuestas nacionales de adicciones y en comunidad escolar que permitan hacer comparaciones con los datos de la Encuesta del 2008. En el primer caso, el estado se ha incluido en la región norte del país, junto con otras entidades que en 1988 y 1998 reportaron un consumo superior al promedio del país de drogas médicas e ilegales como Baja California y Sonora.

Además se sabe que Sinaloa ha sido uno de los estados con mayor prevalencia en la región.

En estudiantes se cuenta con el antecedente de la encuesta que se realizó en 1991, que se describe más adelante.

Por lo que respecta a centros de tratamiento, se cuenta con amplia información derivada del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA)\* y de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

## Encuestas en estudiantes

En el Estado de Sinaloa el único estudio previo en población escolar es la Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media y Media Superior que se realizó en 1991. Los resultados de la medición indicaron que el 7% del total de la muestra había consumido al menos una droga en su vida, sin incluir al tabaco o al alcohol, por abajo del promedio nacional (8.2%). Por sexo, la proporción de hombres que experimentó con drogas al menos una vez fue superior al de mujeres (9% y 5%, respectivamente). Por tipo de sustancia, los inhalables (2.5%), seguidos de las anfetaminas (2.1%) y los tranquilizantes (1.8%) fueron las sustancias que más consumen los estudiantes<sup>5</sup>.

En lo que respecta al consumo de alcohol el 56.8% del total de la población estudiantil había consumido alcohol alguna vez en la vida y por sexo el 62.6% de los hombres y el 49.9% de las mujeres.

---

\* Para la recolección de información el SISVEA se basa en el "reporte de eventos" de aquellas personas que han acudido a distintas instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales a solicitar tratamiento por consumo de drogas. Da cuenta sobre los casos o pacientes (eventos) que acuden a tratamiento a los diferentes centros de atención (gubernamentales y no gubernamentales) en un estado y esa información se refiere únicamente a la demanda real (efectiva) de atención. También registra las muertes asociadas al consumo. Es importante señalar que el número total de estos eventos puede exceder al de los individuos en contacto con las instituciones que los reportan en un tiempo determinado, toda vez que el mismo individuo puede ser contactado por más de una institución, con lo que puede ser cuantificado en diversos reportes de evento.

## SISVEA

### Mediciones realizadas en los centros de tratamiento no gubernamentales

De acuerdo a los datos registrados por este sistema, en el Estado de Sinaloa la búsqueda de tratamiento ha ido en aumento de 1994 al 2007. Por ejemplo, en 1994 se registraron 190 personas, mientras que en 2007 la demanda de tratamiento ascendió a 5,189 casos. En total en el periodo comprendido se registraron un total de 27,570 personas <sup>6</sup>.

Por otra parte, el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento en este periodo, indica que la mayoría son hombres (90.7%). Por grupos de edad, destaca la población adulta de 35 años o más (28.9%). Por nivel educativo la mayoría tienen secundaria (36.3%). En cuanto al estado civil, la mitad de esta población es soltera (52.8%) y más de una cuarta parte está casada (26.6%). Respecto a su situación laboral, el 30% cuenta con un trabajo ocasional. La mayoría de los usuarios asiste por influencia de amigos y familiares a buscar ayuda (64.2%).

Asimismo, entre 2006 y 2007, las drogas ilegales más consumidas entre la población que acudió a estos centros fueron la marihuana (59.4%), la cocaína (58.1%) y el cristal (57.1%).

Respecto a las drogas de inicio, los datos del 2007, registraron que en los hombres el alcohol (32.7%) y la marihuana (29.5%) y en las mujeres (37.7%) y el tabaco (33.4%) fueron las principales drogas de inicio. En cuanto a la droga de impacto\* que motivó la búsqueda de ayuda, en ambos sexos fue el cristal (46.1% hombres y 38.4% mujeres).

### Mediciones realizadas en los Centros de Integración Juvenil (CIJ)

La información obtenida en los CIJ sobre el perfil sociodemográfico de las personas que acudieron a tratamiento ambulatorio en el 2007,

muestra coincidencias importantes con lo registrado por SISVEA en instituciones no gubernamentales. De tal forma que, la mayor parte de la población que acudió a esta institución en el Estado de Sinaloa, fue del sexo masculino (931 varones y 176 mujeres). En cuanto a la edad, la mayoría fueron adultos de 35 años o más (n=264) y jóvenes entre los 15 y 19 años (n=247). En cuanto al estado civil y la escolaridad, la mayoría eran solteros (n=485) y habían estudiado hasta la secundaria (n=394). En lo que respecta a la ocupación, la mayor parte contaba con un trabajo estable (n=324). El nivel socioeconómico de la mayoría fue medio bajo (n=534) <sup>7</sup>.

El tabaco (54.8% hombres y 60.2% mujeres) y el alcohol (32.8% hombres y 29.5% mujeres) son las principales drogas de inicio en ambos sexos. En cuanto a la droga de impacto, en ambos sexos fueron los estimulantes tipo anfetamínico (29.3% hombres y 25.6% mujeres).

### Mediciones realizadas en los consejos tutelares de menores

Los datos obtenidos por los Consejos Tutelares de Menores indican que del grupo de menores infractores usuarios de drogas, casi el 96% es población masculina. En cuanto al nivel educativo, el 45.6% cuenta con escolaridad máxima de secundaria. En lo que respecta al uso de drogas, la mayoría consume marihuana y cristal. La infracción que cometió el 75.3% de esta población fue el robo <sup>8</sup>.

### Mediciones realizadas en el Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones

En el Estado de Sinaloa, el número de defunciones debido al consumo de alcohol es de 91 habitantes, cifra que corresponde al 0.62% del total de muertes registradas por alcohol en el país. Asimismo, las defunciones ocasionadas por la enfermedad alcohólica del hígado y por el uso de tabaco fueron 22 y 41, respectivamente, que equivalen al 0.27% y 1.62% del total de muertes <sup>9</sup>.

\* La que el paciente identifica con mayor capacidad para producirle efectos negativos (de salud, familiares, laborales, etc.) y que lo motiva a solicitar atención médica.



La Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, así como del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones (ST-CONADIC), encomendó al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) la realización de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008). Sus objetivos incluyen generar información confiable y caracterizar la prevalencia del uso de tabaco, alcohol y drogas en la población adolescente de entre 12 y 17 años de edad y en la población adulta de entre 18 y 65 años. La encuesta busca también conocer los factores asociados a la utilización de estas sustancias, así como las necesidades de atención y el uso de servicios relacionados con el abuso de las mismas.

## Objetivos

Los objetivos que se plantearon para la ENA 2008 son:

- Evaluar la prevalencia del uso de drogas tanto médicas (consumidas fuera de prescripción) como no médicas, alcohol y tabaco en los ámbitos nacional y estatal
- Evaluar las tendencias en el consumo de sustancias en una muestra representativa de las poblaciones urbana y rural del país

La ENA 2008 es una encuesta de hogares con representatividad nacional y estatal, en la que se encuentran representadas poblaciones rurales –aquellas con un número de habitantes menor o igual a 2 500– y urbanas –aquellas con más de 2 500 habitantes. La selección de las unidades muestrales se realizó en múltiples etapas: áreas geoestadísticas básicas (AGEB), manzanas o segmentos, viviendas y, finalmente, personas dentro de los hogares. La selección de viviendas se hizo a partir de los croquis y listados elaborados en campo usando una técnica de muestreo aleatorio sistemático.

En cada hogar, siempre que la composición del mismo lo permitiera, se seleccionó un adulto de entre 18 y 65 años de edad y un adolescente de entre 12 y 17 años. La selección se llevó a cabo

mediante una técnica de muestreo aleatorio simple en cada uno de los dos grupos de edad.

Los resultados obtenidos por la ENA 2008 permiten:

- Identificar los estados de mayor riesgo en relación con el problema de consumo de drogas
- Evaluar la relación de los factores de riesgo ambientales, interpersonales, familiares y personales con la experimentación, el uso habitual y el uso problemático de drogas, alcohol y tabaco
- Desarrollar y evaluar modelos de predicción de consumo de drogas, alcohol y tabaco, con el fin de incidir en la creación e implementación de programas de prevención
- Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con el fin de desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco
- Diseñar nuevas líneas de investigación en el campo del abuso de sustancias
- Conocer la relación que existe entre uso de drogas, comportamiento antisocial, violencia y sintomatología depresiva

Es importante considerar que a pesar de que se eligieron muestras con el mismo diseño y que se mantuvieron estables la mayor parte de las condiciones de las encuestas 2002-2008, hay importantes diferencias; por ejemplo, la encuesta de 2008 se realizó mediante computadora en tanto que la de 2002 se efectuó en una versión lápiz y papel. Adicionalmente, cambiaron las definiciones de consumo alto para las mujeres, ya que internacionalmente se considera para ellas el que hayan consumido 4 copas o más, a diferencia de las 5 copas consideradas en las encuestas anteriores.

## Unidades de análisis

Las unidades de análisis definidas para la ENA 2008 son las siguientes:

- Hogar es el conjunto de personas, relacionadas por algún parentesco o no, que habitualmente duermen en una vivienda bajo el mismo techo, beneficiándose de un ingreso común, aportado por uno o más de los miembros
- Adolescentes son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 12 y 17 años
- Adultos son las personas del hogar cuya edad se sitúa entre los 18 y 65 años

## Cobertura geográfica y de unidades

La información obtenida a través de la ENA 2008 permitirá el cálculo de indicadores estatales con representatividad de las áreas urbanas y rurales de cada entidad federativa. Por razones de tipo operativo no se incluyeron viviendas colectivas tales como instalaciones militares, cárceles, conventos, hoteles, asilos, etcétera.

## Estratificación

Debido a que las Encuestas Nacionales de Adicciones realizadas en 1998 y 2002 señalan la existencia de importantes diferencias para los indicadores de interés según el tamaño de la localidad, para el diseño de la ENA 2008 se decidió estratificar por el tamaño de la localidad, según se muestra en el siguiente cuadro:

Estrato	Descripción
I. Ciudad o área metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudades y áreas metropolitanas</li> <li>• Ciudades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado</li> </ul>
II. Complemento urbano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localidades de 2 500 a 99 999 habitantes</li> </ul>
III. Rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localidades con menos de 2 500 habitantes</li> </ul>

La asignación del tamaño de muestra para cada estrato se hizo de manera proporcional al número de habitantes dentro del estrato.

## Tamaño de la muestra

Para cumplir con los objetivos de la ENA 2008, se consideró que el tamaño de la muestra seleccionado debería permitir estimar proporciones estatales de aproximadamente 12.2%. Además, contemplando que la encuesta debería permitir obtener estimaciones estatales con error y confianza idénticos a los utilizados para el diseño

de la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, se consideró un error relativo máximo de 15%, una confianza de 90%, una tasa de 15% de no respuesta, un efecto de diseño de 2.183 y un promedio de 1.4 individuos entrevistados por vivienda. Se determinó un tamaño de muestra estatal de aproximadamente 1 584 viviendas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot (1-p) \cdot deff}{r^2 \cdot p \cdot TR \cdot h}$$

donde

- $n$  Tamaño de muestra
- $p$  Proporción a estimar
- $z_{\alpha/2}$  Cuantil de una distribución normal asociado con un nivel de confianza deseado  $1-\alpha$
- $r$  Error relativo máximo que se está dispuesto a aceptar
- $deff$  Efecto de diseño, que es la pérdida o ganancia en la eficiencia derivada del uso de un diseño complejo para la ENA 2008
- $TR$  Tasa de respuesta esperada
- $h$  Promedio de entrevistas por vivienda

El tamaño de la muestra en el ámbito nacional fue de 50 688 viviendas, a partir del cual se podrán estimar proporciones mayores o iguales a 0.43% en el ámbito nacional con la misma precisión y confianza que en las estimaciones estatales.

## Esquema de selección

El diseño muestral de la ENA 2008 es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados; para el proceso de selección, se utilizaron datos del Censo de Población y Vivienda de 2000. Ya que en los estratos I y II las localidades incluyen AGEB y en el estrato III las AGEB incluyen localidades, el esquema de selección depende del estrato que se esté observando. Así, los esquemas de selección para los estratos I y II son idénticos, mientras que el esquema para el estrato III es diferente; ambos esquemas se describen a continuación:

## Estratos I y II

- En la primera etapa se seleccionaron  $k$  AGEB con probabilidad proporcional al tamaño (PPT), definido por el número de viviendas particulares habitadas en el AGEB
- Para cada una de las AGEB seleccionadas, se seleccionaron seis manzanas con probabilidad proporcional a su número de viviendas
- Posteriormente, en cada una de las manzanas seleccionadas, se realizó una selección de seis viviendas, utilizando un muestreo sistemático con arranque aleatorio
- En cada una de las viviendas seleccionadas y siempre que la composición del hogar lo permitió, es decir, que en el hogar existieran individuos en el rango de edad, se seleccionaron

un adulto y un adolescente, según las definiciones descritas anteriormente, mediante el uso de muestreo aleatorio simple.

La encuesta se aplicó en todos los hogares de la vivienda

- A cada uno de los individuos seleccionados se le aplicó la entrevista siguiendo el cuestionario correspondiente

La constante  $k$  será proporcional al tamaño de muestra asignado al estrato.

### Estrato III

El esquema de selección en el caso de las localidades que conforman el estrato III se describe a continuación:

- Las unidades primarias de muestreo fueron AGEB rurales, que contienen las localidades que conforman el estrato III. La probabilidad de seleccionar un AGEB fue proporcional al número de viviendas particulares habitadas en ella. Se seleccionaron tantas AGEB como viviendas particulares habitadas en el estrato
- La unidad secundaria de muestreo (USM) estuvo constituida por las localidades o grupos de localidades adyacentes, que agruparon un mínimo de 120 viviendas. Estas USM se seleccionaron con probabilidad proporcional al número de viviendas particulares habitadas que existían
- Para cada localidad o grupo de localidades seleccionadas se extrajo una muestra aleatoria sistemática de tres grupos de doce viviendas consecutivas cada uno, llamados segmentos
- En cada una de las viviendas que conformaron los segmentos seleccionados, se aplicó la encuesta en todos los hogares de la vivienda. Siempre que la composición del hogar lo permitió, se seleccionaron un adulto y un adolescente. Esta selección se realizó utilizando muestreo aleatorio simple

### Logística en campo

La ENA 2008 se realizó en dos fases:

- En la primera fase (tamizaje), se elaboraron los croquis y listados de viviendas en las manzanas seleccionadas y se identificó a los residentes habituales (nombre, edad y sexo) de las viviendas seleccionadas. El primer paso consistió en aplicar el cuestionario de hogar y posteriormente se llevó a cabo la selección aleatoria de los adultos y adolescentes. En esta fase también se completó la prueba piloto
- En la segunda fase se recabó información en campo mediante la aplicación de la encuesta a los residentes previamente seleccionados

### Prueba piloto

La prueba piloto tuvo como objetivo general evaluar la metodología, los procedimientos, los instrumentos y la logística de la ENA 2008 a pequeña escala. Con el fin de contar con instrumentos revisados, afinados e implementados en campo, la ENA 2008 incluyó una fase piloto que se llevó a cabo en la localidad de Texcoco, en el Estado de México del 10 al 14 de diciembre de 2007. Se seleccionaron ocho AGEB; al interior de cada una de ellas se seleccionaron dos manzanas, y ahí, se aplicó un total de cinco entrevistas por manzana, lo cual da un total de 80 viviendas seleccionadas. Se utilizaron dos equipos integrados por un jefe de grupo, cuatro entrevistadores y una persona de apoyo informático. Los resultados de la prueba piloto permitieron identificar y corregir errores en el cuestionario e implementar mejoras en el equipo de campo.

### Cuestionarios de recolección de información

El cuestionario se diseñó y programó para aplicarse en computadoras *laptop*. El cuestionario incluyó dos grandes rubros de información: a) información referente a las características de la vivienda y sus residentes habituales y b) información sobre los individuos seleccionados en cada uno de los grupos de edad. El primero se administró en los hogares de la muestra en el ámbito nivel nacional.

El informante adecuado para la sección del hogar fue el jefe de hogar, el ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más sin impedimentos para poder responder y con conocimientos de las características de la vivienda y sus residentes habituales.

Los temas del cuestionario de hogar se pueden clasificar en tres rubros principales:

- Datos de identificación y de control. Se registró información referente a la ubicación de cada vivienda seleccionada: entidad, municipio, localidad, AGEB, manzana, número de vivienda, domicilio y el registro de hasta cuatro visitas del entrevistador, por informante, a fin de asentar el código de resultado definitivo en el plano individual
- Características y nivel socioeconómico del hogar. Se registró información referente al total de cuartos, el tipo de material del piso, el tipo de material de construcción de la vivienda, la disponibilidad de agua entubada, el calentador de agua, la posesión de automóvil, así como al ingreso promedio mensual familiar
- Características de los miembros del hogar. Se identificó el número de miembros del hogar y para cada uno se recabó la siguiente información: nombre (listado de personas), edad, fecha de nacimiento, sexo, parentesco con el jefe de familia, nivel de escolaridad, estado civil y ocupación

## Cuestionario individual

El informante adecuado fue el individuo previamente seleccionado por el equipo de investigación encargado del diseño muestral de la ENA 2008. Se administró un solo cuestionario individual en cada hogar visitado donde hubiera por lo menos un informante elegible, esto es, una persona entre 12 y 65 años de edad cumplidos al momento de la visita. También se incluyó una sobremuestra de adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

El cuestionario individual recabó información con respecto a los siguientes temas:

- Datos sociodemográficos del informante: sexo, edad, estado civil, escolaridad, datos sobre la familia, ocupación e ingreso familiar
- Consumo de tabaco
- Consumo de drogas
- Consumo de alcohol
- Dependencia y abuso al consumo de drogas
- Dependencia y abuso al consumo de alcohol
- Exposición al uso de drogas
- Consumo de drogas en el entorno familiar y social
- Percepción acerca de las drogas y de los usuarios
- Exposición a la prevención de drogas
- Tratamiento por consumo de drogas

El instrumento incluyó otras secciones que evaluaron aspectos de la salud mental como la sintomatología depresiva, el intento suicida y, del contexto social, la violencia de género, la conducta antisocial y la migración, además de los conocimientos y creencias sobre algunas enfermedades como el VIH/SIDA, la hepatitis y su relación con el consumo de drogas y el comportamiento sexual.

La parte principal del instrumento se aplicó al 100% de los entrevistados, y consistió hasta la sección de tratamiento y uso de servicios. Aproximadamente el 40% de los entrevistados, seleccionados aleatoriamente, contestaron las secciones adicionales que se indicaron en el párrafo anterior. Esta situación conlleva que para el análisis de estas secciones, se usa un ponderador específico, distinto del de la sección principal, para obtener resultados expandidos a nivel nacional. Esta situación refleja que al usar uno u otro ponderador, las expansiones de los grupos, sea por sexo, edad u otra variable, varíen ligeramente.

## Levantamiento de la ENA 2008

La fase inicial de campo de la ENA 2008 se llevó a cabo entre abril y junio de 2008. Antes de esta fase, se llevó a cabo una capacitación en la Ciudad de México del 24 de marzo al 4 de abril, en la cual se incluyeron dos días de prueba de campo, con la participación de los casi 300 encuestadores reclutados para el proyecto.

El periodo operativo de la ENA 2008 se implementó de forma simultánea en las 32 entidades federativas, con equipos

integrados por un coordinador estatal, un supervisor y un grupo de encuestadores. Para cada vivienda seleccionada, se programaron hasta cuatro visitas, incluyendo horarios especiales (antes de las 8 am o después de las 8 pm) y fines de semana, para incrementar la probabilidad de encontrar a los ocupantes. La encuesta se aplicó con captura simultánea de datos, es decir, que se utilizaron una aplicación informática y computadoras portátiles en campo para las entrevistas. El cuestionario básico de hogar considera las características demográficas y socioeconómicas, lo que permite contar con información tanto sobre el contexto en el que ocurre el consumo de sustancias, como sobre el perfil de los consumidores y los no consumidores.

El diseño consideró la entrevista de un adulto de entre 18 y 65 años por hogar y de un adolescente de entre 12 y 17 años por hogar. La aplicación informática de la encuesta se programó para realizar una selección aleatoria del individuo o individuos a entrevistar a partir del listado de integrantes obtenido en el cuestionario básico de hogar. Debido a factores externos a la encuesta –relacionados con el contexto nacional y con problemas de inseguridad y climatológicos–, la tasa de respuesta de la encuesta fue menor a la esperada, lo que se tradujo en un número menor del necesario de entrevistas individuales completas para las estimaciones deseadas.

Debido a ello, posterior al término del periodo operativo inicial, se llevó a cabo uno especial de recuperación de entrevistas individuales en un conjunto de 11 entidades; éste se implementó entre julio y agosto de 2008. Adicionalmente, se tomó la decisión de elaborar una muestra más para 21 estados, de forma que se pudiera contar con observaciones suficientes para los análisis propuestos para la ENA 2008. El componente operativo para esta muestra adicional se implementó entre septiembre y octubre de 2008. Ambos operativos adicionales siguieron los procedimientos y estructura utilizados para el original.

Sinaloa fue de las entidades cuya muestra se completó en la primera etapa. Se visitaron 1 476 hogares y se entrevistó a 1 125 individuos, con una tasa de respuesta global de 89.5 por ciento.

## Supervisión del periodo operativo

La estructura de campo se integró con un coordinador nacional, un subcoordinador nacional, 32 coordinadores estatales, 32 supervisores y siete entrevistadores por estado. Los coordinadores estatales y los supervisores fueron los encargados de la supervisión directa de las entrevistas y de la correcta ubicación de las viviendas.

El trabajo de supervisión se diseñó con base en las dos fases siguientes:

- Planeación y organización. En esta etapa, el supervisor de campo agrupó zonas o áreas de trabajo colindantes para optimizar el tiempo de levantamiento y asignó las cargas de trabajo a cada entrevistador a su cargo.
- Supervisión en campo. En esta etapa, el supervisor controló el levantamiento de la información, retroalimentó a los entrevistadores con respecto a las dudas o problemas surgidos durante el levantamiento, así como respecto a los lineamientos de

la capacitación. También verificó que los individuos y los hogares entrevistados fueran los seleccionados, observó directamente una de cada cuatro entrevistas en su área de responsabilidad y confirmó 100% de los códigos de no respuesta.

Adicionalmente, la coordinación nacional de la encuesta en el INSP monitorizó regularmente las actividades en cada estado y, a partir de los informes recibidos –tanto internos como de las supervisiones del personal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz– envió precisiones sobre la aplicación de los instrumentos o actividades del operativo. Se requirió que los coordinadores estatales informaran sobre el desempeño de cada uno de los encuestadores y verificaran las causales de no entrevista de las viviendas. Adicionalmente, el área responsable en el INSP envió supervisión con personal independiente del operativo para recontactar viviendas visitadas por entrevistadores con baja detección de casos de consumo y verificar la realización de las re-entrevistas.

## Supervisión externa ENA 2008

Para garantizar la calidad en los procesos de recopilación de la información en campo y la validez de la propia información, el INSP contrató una empresa para realizar una supervisión externa (SE) a sus procesos de recopilación de información en campo durante el periodo operativo de la encuesta. El objetivo de la SE fue medir la calidad de información en una submuestra de aproximadamente 10% del universo de viviendas de la ENA. El interés del equipo de investigadores de la ENA 2008 fue generar informes sobre procesos de recolección de información por parte de los entrevistadores

en campo y contar con los parámetros que permitieran determinar la validez y la confiabilidad de la información recolectada en campo. El INSP, en colaboración con el INPRFM, diseñó un cuestionario *ad hoc*; el formato de aplicación fue cara a cara y la duración de las entrevistas, fue de aproximadamente 15 minutos. El número estimado de entrevistas fue de 156 por entidad, de las cuales aproximadamente 70% se recabó en zonas urbanas y 30%, en zonas rurales.

La empresa ganadora llevó a cabo un proceso de capacitación en el cual participaron miembros del equipo de investigación del INSP con el fin de resolver dudas sobre temas conceptuales; además, se discutieron los objetivos de la ENA 2008 (mediante el uso de manuales y cuestionarios) y la importancia de contar con una supervisión externa. Durante el proceso de levantamiento en campo de la SE, se entregaron al INSP informes semanales de las incidencias detectadas y se registraron incidentes o situaciones que dificultaban el trabajo en campo. El informe final de la supervisión externa constituye un documento que registra el proceso de recolección de información de la ENA 2008 en la submuestra seleccionada.

## Consideraciones éticas

Todos los participantes leyeron (o les fue leída, en caso necesario) una carta de consentimiento informado. Se recabó información solamente de quienes aceptaron participar y firmaron la carta correspondiente.

En el caso de los menores de edad, los padres o tutores firmaron una carta de asentimiento previo a que el menor proporcionara la información requerida por la encuesta. Se hizo énfasis en el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de la información.



**tabaco**

---

# Principales resultados

## ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada?

La pregunta ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada? tiene como objetivo estimar la prevalencia de vida (*lifetime prevalence*) del consumo de tabaco en la población. Bajo esta definición, se encontró que 26.1% de la población sinaloense entre 18 y 65 años, cerca de 400 mil personas, había probado alguna vez en su vida el cigarrillo. El 37.6% de los hombres y el 15.3% de las mujeres respondieron afirmativamente a esta pregunta (cuadro 1).

## Edad de consumo de tabaco por primera vez

La edad promedio de inicio de consumo de tabaco en la población de 18 a 65 años del estado de Sinaloa es de 17.8 años (IC95% 17.1-18.5).

## Razones de inicio de consumo de tabaco

Las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la curiosidad y la convivencia con fumadores. El 57.7% de los fumadores (56.8% de los hombres y 59.7% de las mujeres) iniciaron el consumo de tabaco por curiosidad, mientras que 36.2% y 21.1% de los hombres y mujeres que fuman comenzaron a hacerlo por convivencia con familiares, amigos o compañeros fumadores (cuadro 2).

## ¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida?

La pregunta ¿Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida? tiene como objetivo estimar la prevalencia de consumo de tabaco en la población. Por muchos años esta fue la pregunta utilizada para la estimación de la prevalencia, en concordancia con la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al usar esta definición, se encontró que 16.8% de la población en el rango en estudio, cerca de 258 200 sinaloenses, había fumado más de 100 cigarrillos en su

vida (cuadro III). Desde el punto de vista epidemiológico (estimación de prevalencias de fumadores, ex fumadores y nunca fumadores), esta definición sobreestima el consumo de tabaco en los adultos. Por esta razón y debido que la epidemia de tabaquismo es un problema de salud pública global y cambiante, que requiere de indicadores válidos y precisos para la vigilancia epidemiológica y la evaluación del cumplimiento de políticas y estrategias de control del tabaco, esta definición dejó de ser utilizada.

## Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado

Para caracterizar la población mexicana respecto al consumo de tabaco, se utilizaron las siguientes definiciones:

- Fumador activo: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber fumado durante el último año
- Ex fumador: persona que contestó haber fumado alguna vez en la vida y haber dejado de fumar hace más de un año
- Nunca ha fumado: persona que contestó no haber fumado en la vida

Mediante el uso de estas definiciones se encontró que, entre los pobladores de 18 a 65 años de Sinaloa, 13.3% eran fumadores activos, lo que representa cerca de 203 mil 400 fumadores en el estado. La comparación de la prevalencia de consumo de tabaco a nivel estatal con el promedio nacional (20.6%) se puede observar en la figura 1. El 12.8% de los encuestados refirió ser ex fumador y el 73.9% no había fumado. El consumo de tabaco en los hombres fue de 20.7% y de 6.2% en las mujeres (cuadro 4).

## Fumadores activos

### Edad de inicio del consumo diario de cigarrillos

En Sinaloa, los fumadores activos de 18 a 65 años inician el consumo diario de cigarrillos, en promedio, a los 17.3 años (IC95% 16.3-18.2). Los hombres a los 16.4 años y las mujeres a los 20.5 años.



**Cuadro 1**

Respuesta a la pregunta ¿Ha fumado alguna vez en su vida?, según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Sinaloa, México, 2008

		Sexo			
		Hombre	Mujer	Total	
<b>No</b>	N*	470.2	662.6	1132.8	
	IC95 %	L. Inferior	403.5	597.0	1034.0
		L. Superior	536.9	728.2	1231.5
	%	62.6	84.7	73.9	
IC95 %	L. Inferior	57.0	80.1	69.9	
	L. Superior	68.0	88.4	77.5	
	<b>Sí</b>	N*	280.3	119.7	400.0
		IC95 %	L. Inferior	227.0	82.4
L. Superior			333.7	156.9	467.5
%	37.4	15.3	26.1		
IC95 %	L. Inferior	32.0	11.6	22.5	
	L. Superior	43.0	19.9	30.1	
<b>Total</b>	N*	<b>750.5</b>	<b>782.2</b>	<b>1532.8</b>	

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro 2**

Razón por la que empezó a fumar según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Sinaloa, México. 2008

		Sexo			
		Hombre	Mujer	Total	
<b>Porque su familia. amigos o compañeros fumaban</b>	N*	100h6	25.2	125.8	
	IC95%	L. Inferior	68.7	7.6	90.5
		L. Superior	132.5	42.9	161.1
	%	36.2	21.1	31.6	
IC95%	L. Inferior	27.7	11.0	24.6	
	L. Superior	45.7	36.5	39.6	
<b>Por curiosidad</b>	N*	158.0	71.5	229.5	
	IC95%	L. Inferior	117.0	43.9	175.6
		L. Superior	199.0	99.1	283.3
	%	56.8	59.7	57.7	
IC95%	L. Inferior	47.5	46.3	49.7	
	L. Superior	65.8	71.9	65.4	
<b>Otra razón</b>	N*	19.3	23.0	42.3	
	IC95%	L. Inferior	8.3	6.8	22.0
		L. Superior	30.4	39.1	62.6
	%	7.0	19.2	10.6	
IC95%	L. Inferior	3.9	9.5	6.5	
	L. Superior	12.2	35.0	16.9	
<b>Total</b>	N*	<b>277.9</b>	<b>119.7</b>	<b>397.6</b>	

\*N en miles.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro 3**

Ha fumado más de 100 cigarrillos (5 cajetillas) en la vida según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Sinaloa, México, 2008


		Sexo			
		Hombre	Mujer	Total	
<b>No</b>	N*	548.3	726.3	1274.6	
	IC95%	L. Inferior	470.0	650.3	1165.8
		L. Superior	626.5	802.3	1383.3
		%	73.0	92.8	83.2
	IC95%	L. Inferior	68.2	89.2	80.3
L. Superior		77.4	95.3	85.7	
<b>Si</b>	N*	202.3	55.9	258.2	
	IC95%	L. Inferior	165.4	31.9	214.8
		L. Superior	239.1	80.0	301.6
		%	27.0	7.2	16.8
	IC95%	L. Inferior	22.6	4.7	14.3
L. Superior		31.8	10.8	19.7	
<b>Total</b>	N*	<b>750.5</b>	<b>782.2</b>	<b>1532.8</b>	

\*N en miles.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Figura 1**

Prevalencia de fumador activo.  
Adultos de 18-65 años.  
Sinaloa, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Consumo diario de cigarrillos (cantidad y duración)**

Los fumadores activos entre 18 y 65 años en Sinaloa fuman, en promedio, 8.4 cigarrillos al día (IC95% 6.5-10.4), con un tiempo promedio de fumar diariamente de 14.7 años (IC95% 12.6-16.8). El 77.4% de los fumadores activos consume menos de 16 cigarrillos al día, 17.4% de 16 a 25 cigarrillos y 5.1% más de 26 cigarrillos.

**Adicción**

Algunas de las características de los fumadores activos (aquellos que fumaron cigarrillos durante el último año) en la población entre 18 y 65 años residente en Sinaloa, son las siguientes: 74.2% le dan el golpe al cigarro algunas veces o siempre; 13.5% fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse; el periodo en el que fuman con mayor frecuencia, en 89.8% de los casos, es en el transcurso de la tarde y la noche.

**Estrategias para dejar de fumar**

A los fumadores activos entre 18 y 65 años se les solicitó información sobre el dejar de fumar. Sobre esto 9.1% contestaron que les sería difícil abstenerse de fumar en lugares públicos, y 54.9% que han intentado dejar de fumar alguna vez. Las principales formas en que lo hicieron fueron: dejar de fumar súbitamente (56.3%); dejar de comprar cigarrillos (20.2%) disminuir gradualmente el número de cigarrillos (20.1%); otra el 1.3%. Únicamente 2.1% se ha sometido a algún tratamiento para dejar de fumar.

**Cuadro 4****Fumador activo, Exfumador y Nunca ha fumado según sexo. Adultos de 18 – 65 años. Sinaloa, México, 2008**

		Sexo			
		Hombre	Mujer	Total	
Nunca ha Fumado	N*	470.2	662.6	1132.8	
	IC95%	L. Inferior	403.5	597.0	1034.0
		L. Superior	536.9	728.2	1231.5
		%	62.6	84.7	73.9
	IC95%	L. Inferior	57.0	80.1	69.9
L. Superior		68.0	88.4	77.5	
Fumador actual***		N*	155.0	48.3	203.4
	IC95%	L. Inferior	119.3	24.5	157.0
		L. Superior	190.8	72.1	249.7
		%	20.7	6.2	13.3
	IC95%	L. Inferior	17.0	3.8	10.8
L. Superior		24.8	9.8	16.2	
Exfumador		N*	125.3	71.3	196.6
	IC95%	L. Inferior	93.2	40.7	148.9
		L. Superior	157.4	102.0	244.4
		%	16.7	9.1	12.8
	IC95%	L. Inferior	13.1	6.1	10.1
L. Superior		21.0	13.5	16.1	
Total		N*	<b>750.5</b>	<b>782.2</b>	<b>1532.8</b>

\*N en miles

\*\* Fumó en el último año

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

El 82% de los fumadores activos entre 18 y 65 años ha escuchado hablar sobre algún medicamento que ayuda a dejar de fumar. De ellos, 68.6% están de acuerdo en que si decidieran dejar de fumar, las medicinas (chicles y parches con nicotina, o bupropión) les ayudarían a hacerlo; 35.5% opinaron que dichas medicinas son muy caras; 22.2% contestaron que estas medicinas pueden dañar su salud; 13.4% respondieron que esas medicinas son muy difíciles de conseguir. Finalmente, 78.1% mencionaron que si decidieran dejar de fumar, podrían hacerlo sin la ayuda de las mencionadas medicinas (cuadro 5).

**Ex fumadores**

En Sinaloa, 12.8% de la población entre 18 y 65 años, cerca de 196 mil personas, refirieron ser ex fumadores. La edad promedio en la que los adultos que, habiendo fumado alguna vez en su vida, y que al momento de la encuesta se consideraban ex fumadores, dejaron de fumar, fue a los 31.4 años; a los 32.6 años para el caso de los hombres y a los 29.3 para las mujeres. Estos ex fumadores fumaban, en promedio, 12.1 cigarrillos al día: 12.5 y 10.8 los hombres y las mujeres, respectivamente. Las principales razones por las que los ex fumadores dejaron de fumar fueron: por conciencia del daño a la salud (46.7%) y porque se hartaron de fumar (22.8%). Semejantes proporciones fueron obtenidas al estratificar por sexo.

**Nunca han fumado**

El 73.9% de la población (62.6% de los hombres y 84.7% de las mujeres) entre 18 y 65 años del estado de Sinaloa refirió no haber fumado.

**Exposición al humo de tabaco ambiental (HTA)**

17.9% de los encuestados que nunca han fumado, representativos de cerca de 258 mil sinaloenses, reportaron estar expuestos al humo de tabaco ambiental (HTA); así lo expresaron 20.9% de los hombres y 15.5% de las mujeres en esta categoría, mientras que 17% de los adolescentes, equivalente a cerca de 53 mil adolescentes en el estado, reportaron estar expuestos al HTA (cuadro 6).

**Percepción de las políticas de control del tabaco**

En cuanto a la opinión que los participantes de esta encuesta expresaron sobre las medidas de protección a la salud relativas al establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos, estuvieron completa o medianamente a favor de que fueran establecidas: en restau-

**Cuadro 5**

Opinión de los fumadores activos sobre los medicamentos para dejar de fumar. Adultos de 18 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

	N*	IC95%		%	IC95%	
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior
<b>Si decidiera fumar, estas medicinas le ayudarían a hacerlo</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	114.4	85.8	143.1	68.6	56.5	78.6
Complemento	52.4	29.5	75.3	31.4	21.4	43.5
<b>Las medicinas para dejar de fumar son carísimas</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	59.3	37.6	81.0	35.5	26.3	46.0
Complemento	107.5	80.5	134.5	64.5	54.0	73.7
<b>Las medicinas para dejar de fumar pueden dañar su salud</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	37.0	20.1	54.0	22.2	14.1	33.1
Complemento	129.8	96.7	162.8	77.8	66.9	85.9
<b>Si decidiera dejar de fumar, podría hacerlo sin estas medicinas</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	130.2	97.0	163.4	78.1	67.8	85.7
Complemento	36.6	20.8	52.4	21.9	14.3	32.2
<b>Las medicinas para dejar de fumar son muy difíciles de conseguir</b>						
Totalmente de acuerdo/De acuerdo	22.3	10.1	34.6	13.4	8.0	21.6
Complemento	144.5	112.1	176.8	86.6	78.4	92.0
<b>Total</b>	<b>166.8</b>	<b>131.5</b>	<b>202.1</b>	<b>100.0</b>		

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro 6**

Exposición a humo de tabaco ambiental, según sexo y grupos de edad. Sinaloa, México, 2008

		Sexo		Grupos de edad			
		Hombre	Mujer	Adolescentes	Adultos	Total	
<b>No</b>	N*	492.4	696.2	260.9	927.8	1188.7	
	IC95 %	L. Inferior	413.7	619.7	223.3	825.6	1066.9
		L. Superior	571.2	772.7	298.4	1030.0	1310.4
	%	79.1	84.5	83.0	81.9	82.1	
IC95 %	L. Inferior	72.0	80.8	76.8	77.1	77.8	
	L. Superior	84.7	87.6	87.8	85.9	85.8	
<b>Sí</b>	N*	130.4	127.9	53.3	205.0	258.3	
	IC95 %	L. Inferior	89.4	97.1	32.8	155.6	197.9
		L. Superior	171.4	158.7	73.9	254.4	318.7
	%	20.9	15.5	17.0	18.1	17.9	
	IC95 %	L. Inferior	15.3	12.4	12.2	14.1	14.2
		L. Superior	28.0	19.2	23.2	22.9	22.2
<b>Total</b>	N*	<b>622.9</b>	<b>824.1</b>	<b>314.2</b>	<b>1132.8</b>	<b>1447.0</b>	

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

tes y otros lugares en donde se expenden alimentos, 89.6%; en cines y otros lugares de espectáculos, 88.7%; en bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol, 80.3%; en hospitales y otros centros de atención a la salud, 88%; en lugares de trabajo, 87.9%; en el transporte

público, 86.9%. El 95.7% estuvo completa o medianamente a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado. Proporciones semejantes se obtienen al estratificar por edad, es decir, entre los adolescentes y los adultos (cuadro 7).

**Cuadro 7**

Percepción sobre medidas de protección a la salud en lugares públicos según grupos de edad. Sinaloa, México, 2008

	N*	IC95%		%	IC95%	
		L. Inferior	L. Superior		L. Inferior	L. Superior
<b>Adolescentes</b>						
<b>En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	287.0	247.4	326.5	86.3	78.8	91.4
Complemento	45.5	22.3	68.7	13.7	8.6	21.2
<b>En cines y otros lugares de espectáculos</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	285.0	245.6	324.5	85.7	78.5	90.8
Complemento	47.4	24.5	70.4	14.3	9.2	21.5
<b>En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	259.6	221.7	297.4	78.1	69.8	84.6
Complemento	72.9	43.9	101.9	21.9	15.4	30.2
<b>En hospitales y otros centros de atención a la salud</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	278.1	238.2	318.0	83.7	76.3	89.1
Complemento	54.3	30.4	78.2	16.3	10.9	23.7
<b>En lugares de trabajo</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	280.3	241.2	319.4	84.3	76.9	89.7
Complemento	52.1	28.0	76.2	15.7	10.3	23.1
<b>En el transporte público</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	277.5	237.8	317.2	83.5	76.0	88.9
Complemento	54.9	30.8	79.1	16.5	11.1	24.0
<b>Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	310.1	266.4	353.7	93.3	89.5	95.7
Complemento	22.4	11.7	33.1	6.7	4.3	10.5
<b>Total</b>	<b>332.4</b>	<b>286.4</b>	<b>378.5</b>	<b>100.0</b>		
<b>Adultos</b>						
<b>En los restaurantes y otros lugares en donde se expenden alimentos</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	1383.6	1277.5	1489.7	90.3	87.0	92.8
Complemento	149.2	102.8	195.6	9.7	7.2	13.0
<b>En cines y otros lugares de espectáculos</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	1368.9	1261.6	1476.3	89.3	86.2	91.8
Complemento	163.9	118.8	208.9	10.7	8.2	13.8
<b>En bares y otros lugares en donde se venden bebidas con alcohol</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	1238.9	1131.2	1346.6	80.8	77.4	83.9
Complemento	293.9	240.5	347.3	19.2	16.1	22.6
<b>En hospitales y otros centros de atención a la salud</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	1363.9	1253.0	1474.8	89.0	84.8	92.1
Complemento	168.9	110.6	227.1	11.0	7.9	15.2
<b>En lugares de trabajo</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	1359.6	1249.6	1469.6	88.7	85.1	91.5
Complemento	173.2	121.5	224.9	11.3	8.5	14.9
<b>En el transporte público</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	1342.9	1236.6	1449.1	87.6	83.6	90.7
Complemento	189.9	131.8	248.1	12.4	9.3	16.4
<b>Debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado</b>						
Completamente a favor/medianamente a favor	1475.0	1371.4	1578.5	96.2	94.4	97.5
Complemento	57.8	32.9	82.8	3.8	2.5	5.6
<b>Total</b>	<b>1532.8</b>	<b>1417.8</b>	<b>1647.8</b>	<b>100.0</b>		

\*N en miles

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

# Conclusiones

**A**nivel nacional en la población de 18 a 65 años se encontró que 20.6% de la población era fumadora activa (31.3% de los hombres y 10.9% de las mujeres); 19.6% eran ex fumadores (24.3% de los hombres y 15.3% de las mujeres), y 59.8% nunca habían fumado (44.4% de los hombres y 73.9% de las mujeres).

En Sinaloa se encontró que los fumadores activos constituían 13.3% de la población (cerca de 203 mil 400 personas), lo que hace que ocupe el lugar vigésimo noveno en consumo de tabaco en la República Mexicana. Los fumadores activos iniciaron el consumo diario de cigarrillos a los 17.3 años, fuman en promedio 8.4 cigarrillos diarios y 13.5% de ellos fuman el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse.

El 12.8% de la población en el rango estudiado, cerca de 197 mil, son ex fumadores y la razón más importante por la que dejaron

de fumar fue la conciencia por los daños a la salud que provoca el consumo de tabaco.

El 73.9% de este sector poblacional, cerca de 1.13 millones de personas, refirió nunca haber fumado. Sin embargo, de este grupo 18.1% de los adultos, cerca de 205 mil, y 17% de los adolescentes, cerca de 53 mil 300, reportaron estar expuestos al humo de tabaco ambiental (HTA).

La opinión de los habitantes de Sinaloa acerca del establecimiento de espacios libres de humo de tabaco en lugares públicos es de apoyo, pues más de 95% de los adultos y adolescentes estuvo completa o medianamente a favor de que debería prohibirse el consumo de tabaco en cualquier lugar cerrado.

drogas

# Principales resultados

Los resultados en el estado de Sinaloa muestran que la exposición al consumo de drogas (que les hayan regalado o intentado vender drogas) sólo en el caso de los hombres es mayor que el promedio nacional, mientras las mujeres están debajo del promedio. Al comparar la exposición en el estado con la nacional, la razón es de 1.2 hombres de Sinaloa por uno del país y en el caso de las mujeres es de 1.4 del país por una del estado.

Como en los resultados nacionales, más hombres (35.8%) que mujeres (5.8%) están expuestos.

En las prevalencias del consumo global de drogas (sin incluir tabaco ni alcohol), se observa que el consumo en los hombres está dentro del promedio, mientras que en las mujeres es mayor al promedio nacional (figura 1).

Una situación similar ocurre para las drogas ilegales, en donde el consumo de los hombres (8.8%) se encuentra dentro del promedio y en las mujeres (4.0%) está arriba del promedio nacional (figura 2).

Para las drogas médicas, se observa a los hombres dentro del promedio nacional y las mujeres debajo del promedio.

En algunas drogas específicas, el consumo de cocaína y metanfetaminas es mayor en hombres y mujeres del estado en comparación con el promedio nacional. En cuanto al consumo de marihuana, los hombres se encuentran debajo del promedio y en las mujeres están arriba del promedio nacional (figura 3).


Además de lo señalado anteriormente, en todos los casos, el consumo de estas drogas es mayor en los hombres en comparación con las mujeres.

Los datos de la encuesta permiten aproximarnos a la demanda de necesidades de atención de la población total, de manera que en lo alto de la pirámide de atención, se observa que el 0.7% de ella presenta dependencia, que corresponde a casi 12,700 personas en el estado.

Al analizar otros aspectos sobre el consumo de drogas, casi dos terceras partes de los hombres y las mujeres, señalan que el número de usuarios se ha incrementado en los últimos cinco años en el país.

**Figura 1**

Exposición y consumo de drogas según sexo. Sinaloa, México, 2008




Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Figura 2**


Consumo de drogas médicas e ilegales según sexo. Sinaloa, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Figura 3**

Consumo de marihuana, cocaína y metanfetaminas según sexo. Sinaloa, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

De la misma forma, prevalece la concepción de que el adicto a las drogas es alguien que necesita ayuda (70.8%) y es una persona enferma (61.0%); en tanto, una menor proporción considera que es alguien egoísta (2.3%) o que es una persona independiente (2.1%).

En cuanto a qué hacer para rehabilitar a las personas adictas a las drogas, la mayor parte de la gente señala que deben ser enviadas a granjas especiales fuera de la ciudad (74.1%).

Con relación a la percepción de qué tan adictivas son las drogas, la marihuana (90.4%), el alcohol (85.6%) y la cocaína (85.4%) son las que señalan en el estado como las de mayor potencial adictivo.

Al analizar algunas de las características de quienes usan drogas, especialmente en la población de 12 a 25 años, se observa que principalmente son personas que ya no están estudiando, que se encuentran trabajando o recibiendo algún salario que les permite comprarla y que están viviendo sólo con su papá, además de que en el entorno social en que se mueven, hay personas que consumen drogas.

# Conclusiones

Los resultados muestran que en el estado, el consumo de cocaína y metanfetaminas es mayor al promedio en ambos sexos y, el consumo de marihuana en mujeres es mayor y en hombres es menor al promedio nacional. En el estado, el porcentaje de personas dependientes al consumo de drogas es de 0.7%, que está arriba del promedio nacional que es del 0.6%.

También se muestra que la exposición a la oportunidad de consumo en el estado, sólo en el caso de los hombres es mayor que el promedio nacional, mientras las mujeres están debajo del promedio.

De la misma forma, es la población más joven, que ya no estudia, se encuentra trabajando o vive sólo con su papá, la que está más

expuesta y consume en mayor proporción drogas. Lo cual refuerza el valor protector no sólo de la asistencia a la escuela, sino de la importancia de dotar de estrategias académicas que permitan experimentar el éxito escolar. En el ámbito familiar, es importante trabajar con los padres en estrategias parentales efectivas

Estos datos señalan un incremento en el consumo de sustancias en este estado. De manera especial, el crecimiento en el consumo de metanfetaminas y de cocaína muestra una problemática importante en el estado que comienza a parecerse a Baja California y Sonora, aunque el número de personas con posible dependencia al consumo de drogas se encuentra dentro del promedio nacional.

**alcohol**

---

# Principales resultados

**A**l considerar el consumo diario de alcohol, los hombres (1.2%) se encuentran debajo del promedio nacional, mientras que no se presenta ningún caso en mujeres del estado.


En cuanto al consumo alto, en los hombres (39.0%) se observa un consumo dentro del promedio nacional y en las mujeres (11.8%) está debajo del promedio nacional (figura 1).

Para el consumo consuetudinario, en el estado se encuentra que para los hombres (9.3%) está dentro del promedio nacional y en las mujeres (2.2%) está arriba del promedio (figura 2).

Finalmente, en relación con el abuso/dependencia, en el estado se encuentra que los hombres (9.1%) se encuentran dentro del promedio y las mujeres (0.8%) están debajo del promedio nacional.

**Figura 1**


Consumo diario y alto de alcohol según sexo. Sinaloa, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Figura 2**

Consumo consuetudinario y abuso/dependencia de alcohol según sexo. Sinaloa, México, 2008



Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

# Conclusiones

**E**n el caso de alcohol, el consumo en el estado en general, es menor al promedio nacional. Los hombres se encuentran dentro del promedio, tanto en consumo alto, consuetudinario y abuso/dependencia. Solo en las mujeres el consumo consuetudinario está arriba del promedio nacional.

Bajo este contexto, es importante canalizar mayores esfuerzos a la prevención primaria del problema, en los distintos segmentos de la sociedad, con la intención de disminuir la problemática y, de manera

especial, trabajar con la población infantil, a fin de dotar a esta comunidad de mejores estrategias para enfrentar la problemática y tener mejores oportunidades de vida.

El incremento en el número de usuarios/as fuertes y los problemas asociados, nos indica la necesidad prioritaria de atender adecuadamente y con estrategias efectivas a quienes se encuentran en el proceso de adicción al consumo.



# referencias y glosario

# Referencias

1. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Primera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
2. Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. Segunda Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1993.
3. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, Instituto Mexicano de Psiquiatría, Dirección General de Epidemiología, Consejo Nacional Contra las Adicciones. Tercera Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 1998.
4. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Dirección General de Epidemiología, Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática. Cuarta Encuesta Nacional de Adicciones. México: SS, 2002.
5. Villatoro J, Gutiérrez M, Quiroz N, Moreno M, Gaytán L, Gaytán F *et al.* Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2006. México DF: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2007.
6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Tratamiento no Gubernamentales. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
7. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Centros de Integración Juvenil. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
8. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Consejo Tutelar para Menores. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.
9. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. Informe Anual (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). México: SS, Dirección General de Epidemiología. Disponible en: <http://www.dgepi.salud.gob.mx/infoepi/index.htm>.



## Tabaco

**Adolescente:** en la encuesta, persona de 12 a 17 años de edad.

**Adulto:** en la encuesta, persona de 18 a 65 años de edad.

**Ex fumador:** persona que al momento de la entrevista refirió haber dejado de fumar cigarros hace más de un año.

**Fumador actual:** persona que al momento de la entrevista refirió haber fumado cigarros al menos una vez durante el año previo a la entrevista.

**Fumador pasivo:** persona que refirió nunca haber fumado, que convive a diario con al menos una persona que fuma cigarros en su casa, en el salón de clases o en su trabajo.

**Localidad rural:** localidad con menos de 2 500 habitantes.

**Localidad urbana:** localidad con 2 500 habitantes o más.

**Nunca fumador:** persona que al momento de la entrevista refirió nunca haber fumado cigarros en su vida.

## Drogas

**Drogas ilegales:** marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína o estimulantes tipo anfetamínico (metanfetaminas).

**Drogas médicas:** son aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como los opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. Para considerarse como consumo para drogarse, el uso se debe dar fuera de o en mayor tiempo al prescrito por el médico.

**Incidencia acumulada:** se refiere a la prevalencia global de consumo.

**Consumo en los últimos 12 meses:** consumo de alguna sustancia en los últimos 12 meses; también se le conoce como prevalencia anual.

**Consumo en los últimos 30 días:** Consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días; también se le conoce como prevalencia actual.

**Índice de continuidad:** es el porcentaje obtenido de dividir el número de usuarios del último año entre el número de usuarios que han consumido alguna vez.

**Formas de uso:** vía de utilización de las distintas drogas ilegales. En el cuestionario se les pregunta si las usaron en forma inyectada, inhalada, aspirada, fumada, tomada, tragada o comida.

**Uso de servicios:** se refiere a que la población acude en búsqueda de apoyo para sus problemas de salud. En el caso de esta encuesta se les pregunta si han solicitado ayuda por el consumo de alguna de las drogas en los siguientes lugares: hospital general o centro comunitario, hospital o servicio psiquiátrico, médicos privados, sacerdotes, curanderos, grupo de Alcohólicos Anónimos u otros.

**Mariguana regalada o comprada:** se refiere a los individuos a los que les han ofrecido esta sustancia regalada o para su compra.

**Cualquier droga regalada o comprada:** se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, sea regalada o para su compra.

**Otra droga regalada o comprada:** se refiere a los individuos a los que les han ofrecido cualquier droga, a excepción de la marihuana, sea regalada o para su compra.

**Índice de exposición a drogas:** es la oportunidad que tienen los sujetos de usar alguna droga debido a que se la han ofrecido regalada o comprada.

**Consumo experimental:** es cuando una persona reporta haber usado entre una y cinco veces una o más sustancias.

**Consumo regular:** es cuando una persona reporta haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones.

**Dependencia a drogas:** es cuando una persona reporta haber tenido tres o más síntomas de dependencia asociados a su consumo.

**Remisión por uso de drogas:** se refiere a cuando una persona asistió a tratamiento debido a su consumo de drogas.

**Uso dada la oportunidad:** se refiere a las personas que consumen drogas y que reportaron que previamente se les había ofrecido alguna sustancia.

**Dependencia dado el abuso:** se refiere a las personas que reportaron haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones y además presentan dependencia a las drogas.

**Remisión dado el abuso:** se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su abuso de drogas.

**Remisión dada la dependencia:** se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su dependencia hacia las drogas.

**Necesidades de atención por uso de drogas:** se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de dependencia a las drogas, el segundo valor es el de uso sin dependencia, seguido por exposición a drogas sin consumo y finalmente el no consumo.

## Alcohol

**Consumo diario:** Consumir diariamente al menos una copa de una bebida con contenido de alcohol.

**Bebedores altos:** Aquellas personas que por lo menos alguna vez en su vida han consumido cinco copas o más en una sola ocasión, para los hombres, o cuatro copas o más en una sola ocasión, para las mujeres.

**Abuso/dependencia al alcohol:** Se refiere a una concepción amplia que incluye la presencia de distintos problemas en el área interpersonal, social y laboral, además de algunas manifestaciones físicas, cognitivas y del comportamiento, que llevan al individuo a un malestar significativo. El criterio de abuso/dependencia se cumple si al menos tres o más de los síntomas de este consumo problemático, o al menos uno de abuso, están presentes en algún momento repetitivamente dentro de los últimos 12 meses.

**Equivalencias de bebidas alcohólicas:** Para efectos de establecer el patrón de consumo y el consumo per cápita, se consideran las siguientes equivalencias:

Un trago o copa es igual a:

- 1 lata o botella mediana de cerveza (330 ml)
- 1 jarro o jícara de pulque de 500 ml
- 1 vaso de 120 ml de vino de mesa
- 1 vaso o copa de destilados: brandy, ron, whisky, vodka, ginebra (30 ml)
- 1 botella "coolers" de vino (300 ml)
- 1 copa "farolazo" (30 ml)

**Necesidades de atención por consumo de alcohol:** Se toman cuatro valores, el de mayor problema es el de abuso/

dependencia al alcohol, el segundo valor es el de presentar algún problema de abuso/dependencia, sin que reúna el criterio de abuso/dependencia completo. El tercer valor de riesgo consiste en haber consumido cinco copas (hombres) o cuatro copas (mujeres) alguna vez en la vida, sin incluirse en las categorías anteriores. Finalmente, la cuarta categoría corresponde a quienes no han consumido alcohol o cuyo consumo ha sido muy bajo.

## Conceptos de metodología

**Estudios epidemiológicos:** Una visión global del problema se obtiene utilizando diferentes estrategias que permiten conocer la extensión y magnitud del consumo en diferentes grupos de población; para interpretar sus resultados es necesario que se tome en cuenta sus características propias, ventajas y desventajas. Los porcentajes de consumo que se anexan en la sección de antecedentes y que provienen de estas dos fuentes no son estrictamente comparables. Permiten sin embargo determinar si han existido cambios en los índices con el tiempo, en las diferencias por sexo o por tipo de droga. Los siguientes apartados guían al lector sobre los diferentes estudios que se citan en la sección de antecedentes en cada estado, a fin de facilitar su lectura adecuada.

**Encuestas en población escolar sobre adicciones:** Las encuestas de escuelas tienen la ventaja de ser autoaplicables. Las encuestas que se citan en la sección de antecedentes se aplicaron en forma colectiva sin identificar al sujeto, la última unidad de análisis es el grupo escolar y sólo participa un encuestador/a por grupo sin la presencia de maestros/as o autoridades de la escuela. El método facilita las respuestas de los/as estudiantes y regularmente se obtienen resultados más elevados que en las encuestas en hogares. Tienen como desventaja el excluir a la población joven que ya no está en la escuela, haberse aplicado en un rango corto de edad de los 12 a 19 años (sólo cuando se incluyen estudiantes de licenciatura el rango se incrementa hacia los 25 años), los estudios hechos en 1991, aquellos hechos en la Ciudad de México y que se han ampliado a partir del 2000 en diversos estados, abarcan población rural y urbana.

**Encuestas en hogares sobre adicciones:** Las encuestas de hogares abarcan a un rango más amplio de población, incluyen población de 12 a 65 años, abarcan población urbana y rural incluyen población adolescente y adulta que asiste y no asiste a la escuela e incluyen viviendas desde las que se ubican en grandes metrópolis hasta viviendas ubicadas en municipios poco habitados y con índices más bajos de consumo, además al ser autoaplicables tienden a tener un índice más alto de baja

respuesta. En estos estudios se elige en forma aleatoria a uno o más individuos en el hogar, una vez aplicada una cédula de la vivienda. La entrevista regularmente se hace cara a cara y la persona entrevistada sabe que el/a entrevistador/a conoce su nombre y la ubicación de su domicilio. El/a participante elige si participa o no y se le da un formato de consentimiento informado. Dado que es una entrevista cara a cara, la aplicación se realiza en forma individual. Ante ello, es importante que el/la entrevistador/a tenga un alto grado de entrenamiento y manejo de la situación de entrevista, a fin de dirigirla en forma ágil y que se gane la confianza del/a entrevistado/a para que se obtengan respuestas reales, especialmente en temas difíciles como el consumo de drogas o situaciones problemáticas asociadas al consumo. Comúnmente en nuestro país, la población objetivo de estos estudios es aquella que vive en sus hogares, entre los 12 y 65 años de edad y que sepan hablar español.

**Estudios con usuarios de drogas (SISVEA, CIJ):** Estos estudios se llevan a cabo con población ya consumidora de drogas y que decide asistir a una opción de tratamiento debido a su consumo de drogas, por lo que el 100% de las personas consumen drogas. Por lo común, se aplica una cédula estandarizada sobre el consumo y abuso de diversas drogas y elementos que permiten obtener el perfil de los/as usuarios/as, la aplicación se realiza la primera vez que el/a usuario/a asiste al centro de tratamiento y se aplica en forma de entrevista cara a cara. Debido a estas situacio-

nes es que los porcentajes de consumo derivados de estos estudios son más altos que en la población de los dos estudios anteriores. Adicionalmente, la proporción de hombres que van a este tipo de tratamiento es mucho mayor, aunque recientemente se está incrementando el número de mujeres que solicitan ayuda por su consumo de droga.

Ante las diferencias en el método y poblaciones de estos tipos de estudios, un punto central para determinar congruencia entre lo que se reporta en unos y otros, es principalmente el orden de preferencia de las drogas, que debe ser similar entre ellos, aunque cuando se da un cambio importante en las preferencias, éste se registra dos o tres años después en los estudios con usuarios de drogas, ya que primero se detecta en los estudios con escolares y población general. Hacer una comparación de prevalencias es posible aunque inadecuado, ya que los rangos de edad no son iguales y los métodos de aplicación de los cuestionarios no son iguales. Otro punto de interés para comparar resultados es la detección de casos de consumo de drogas de más difícil acceso, si está presente el consumo de una droga en el estado, en los tres ámbitos de estudio señalados, debe aparecer la presencia de la droga.

Finalmente, internacionalmente y en el país, es común que las cifras de consumo en hogares son menores a las detectadas en escolares. En el caso de usuarios/as no hay comparación en el indicador, debido a que en el denominador sólo hay usuarios/as.



# anexos

---

## A. Drogas

Resultados del estado

---

Intervalos de confianza

## B. Alcohol

Resultados estatales

---

Intervalos de confianza

## C. Estadísticas de fuentes estatales

sobre antecedentes de consumo de drogas

## Resultados del estado

### Cuadro A1

Características sociodemográficas según sexo de la población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Características sociodemográficas	Hombres			Mujeres			Total		
	12-17 años %	18-25 años %	26-65 años %	12-17 años %	18-25 años %	26-65 años %	12-17 años %	18-25 años %	26-65 años %
<b>Situación escolar</b>									
Estudiante	78.2	43.0	2.2	86.1	27.1	2.3	82.1	35.2	2.2
No estudiante	21.8	57.0	97.8	13.9	72.9	97.7	17.9	64.8	97.8
<b>Nivel de escolaridad</b>									
Ninguna/primaria	28.5	13.2	40.0	20.7	13.1	38.4	24.6	13.1	39.2
Secundaria	52.3	11.6	22.3	63.1	18.9	23.3	57.7	15.2	22.8
Bachillerato o equivalente	19.2	39.5	17.8	16.2	41.0	18.6	17.7	40.3	18.2
Licenciatura	--	35.6	18.5	--	27.0	18.9	--	31.4	18.7
Posgrado	--	--	1.5	--	--	.8	--	--	1.1
<b>Situación laboral</b>									
Trabaja actualmente	21.7	58.3	90.7	7.8	44.1	45.2	14.8	51.3	67.2
Ama de casa	.4	--	.8	7.3	31.0	49.6	3.8	15.2	26.0
Desempleado	77.9	41.7	8.6	84.9	24.9	5.1	81.3	33.5	6.8
<b>Vive con</b>									
Padre y Madre	67.9	67.1	10.0	66.3	36.5	12.1	67.1	52.1	11.1
Sólo padre	.4	1.4	2.2	1.8	--	.9	1.1	.7	1.6
Sólo madre	13.4	17.6	7.3	22.4	16.3	4.6	17.8	17.0	5.9
Otro	18.4	13.9	80.5	9.6	47.2	82.3	14.0	30.2	81.5
<b>Estado civil</b>									
Casado/unión libre	2.1	18.2	74.8	4.6	37.7	68.7	3.3	27.8	71.7
Separado/viudo/divorciado	--	1.9	6.6	--	3.7	13.1	--	2.8	9.9
Soltero	97.9	79.9	18.6	95.4	58.6	18.3	96.7	69.4	18.4

\*Porcentajes obtenidos de la población total por columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A2**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas según sexo población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 924 938		Mujeres 940 294		Total 1 865 232	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	577 876	62.5	594 289	63.2	1 172 165	62.8
Sigue igual	263 655	28.5	301 463	32.1	565 118	30.3
Parece que va disminuyendo	83 407	9.0	44 542	4.7	127 949	6.9

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A3**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 764 048		26-34 años 384 611		35-65 años 716 573	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	458 445	60.0	269 178	70.0	444 542	62.0
Sigue igual	249 719	32.7	92 955	24.2	222 444	31.0
Parece que va disminuyendo	55 884	7.3	22 478	5.8	49 587	6.9

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A4**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad en hombres. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 387 033		26-34 años 200 174		35-65 años 337 731	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	237 219	61.3	130 204	65.0	210 453	62.3
Sigue igual	109 115	28.2	55 133	27.5	99 407	29.4
Parece que va disminuyendo	40 699	10.5	14 837	7.4	27 871	8.3

\*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A5**

Percepción sobre las tendencias del consumo de drogas por grupos de edad en mujeres. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 377 015		26-34 años 184 437		35-65 años 378 842	
	N	%	N	%	N	%
<b>Creencias sobre la evolución del problema de las drogas ilegales en los últimos cinco años en México</b>						
Ha incrementado el número de usuarios	221 226	58.7	138 974	75.4	234 089	61.8
Sigue igual	140 604	37.3	37 822	20.5	123 037	32.5
Parece que va disminuyendo	15 185	4.0	7 641	4.1	21 716	5.7

\*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A6**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas según sexo población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 924 938		Mujeres 940 294		Total 1 865 232	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	566 490	61.2	570 676	60.7	1 137 166	61.0
Débil	314 106	34.0	320 109	34.0	634 215	34.0
Independiente	12 552	1.4	27 292	2.9	39 844	2.1
Egoísta	13 436	1.5	29 439	3.1	42 875	2.3
Que necesita ayuda	664 290	71.8	655 957	69.8	1 320 247	70.8
Delincuente	58 293	6.3	120 403	12.8	178 696	9.6

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A7**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 764 048		26-34 años 384 611		35-65 años 716 573	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	439 737	57.6	231 122	60.1	466 307	65.1
Débil	256 349	33.6	148 270	38.6	229 596	32.0
Independiente	12 718	1.7	7 759	2.0	19 367	2.7
Egoísta	20 033	2.6	6 975	1.8	15 867	2.2
Que necesita ayuda	505 374	66.1	287 820	74.8	527 053	73.6
Delincuente	87 048	11.4	28 784	7.5	62 864	8.8

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Cuadro A8**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad en hombres. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 387 033		26-34 años 200 174		35-65 años 337 731	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	230 709	59.6	103 938	51.9	231 843	68.6
Débil	137 107	35.4	76 069	38.0	100 930	29.9
Independiente	8 448	2.2	4 104	2.1	--	--
Egoísta	6 461	1.7	6 975	3.5	--	--
Que necesita ayuda	260 451	67.3	155 258	77.6	248 581	73.6
Delincuente	24 488	6.3	11 249	5.6	22 556	6.7

\*Porcentajes obtenidos de la población masculina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A9**

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas por grupos de edad en mujeres. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 377 015		26-34 años 184 437		35-65 años 378 842	
	N	%	N	%	N	%
<b>Un adicto es una persona:</b>						
Enferma	209 028	55.4	127 184	69.0	234 464	61.9
Débil	119 242	31.6	72 201	39.1	128 666	34.0
Independiente	4 270	1.1	3 655	2.0	19 367	5.1
Egoísta	13 572	3.6	--	--	15 867	4.2
Que necesita ayuda	244 923	65.0	132 562	71.9	278 472	73.5
Delincuente	62 560	16.6	17 535	9.5	40 308	10.6

\*Porcentajes obtenidos de la población femenina por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A10**

Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 924 938		Mujeres 940 294		Total 1 865 232	
	N	%	N	%	N	%
<b>Considera que estas sustancias producen adicción:</b>						
Mariguana	851 046	92.0	834 460	88.7	1 685 506	90.4
Alucinógenos	558 279	60.4	511 062	54.4	1 069 341	57.3
Cocaína	806 059	87.1	786 350	83.6	1 592 409	85.4
Heroína	692 532	74.9	649 712	69.1	1 342 244	72.0
Inhalables	610 701	66.0	580 811	61.8	1 191 512	63.9
Alcohol	783 985	84.8	813 308	86.5	1 597 293	85.6
Tabaco	764 074	82.6	788 916	83.9	1 552 990	83.3

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A11**

Percepción de la población total sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias por grupos de edad. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 764 048		26-34 años 384 611		35-65 años 716 573	
	N	%	N	%	N	%
<b>Considera que estas sustancias producen adicción:</b>						
Mariguana	685 020	89.7	366 395	95.3	634 091	88.5
Alucinógenos	440 199	57.6	242 179	63.0	386 963	54.0
Cocaína	633 225	82.9	361 955	94.1	597 229	83.3
Heroína	526 201	68.9	322 628	83.9	493 415	68.9
Inhalables	489 540	64.1	280 025	72.8	421 947	58.9
Alcohol	644 655	84.4	342 888	89.2	609 750	85.1
Tabaco	609 751	79.8	336 655	87.5	606 584	84.7

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A12**

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia según sexo. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 924 938		Mujeres 940 294		Total 1 865 232	
	N	%	N	%	N	%
<b>Rehabilitación más efectiva para un adicto:</b>						
Que los metan en la cárcel	--	--	1 069	.1	1 069	.1
Que los internen en hospitales psiquiátricos	64 247	7.0	126 902	13.7	191 149	10.4
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	681 571	74.4	686 453	73.8	1 368 024	74.1
Curarles en su propio ambiente	102 148	11.2	51 452	5.5	153 600	8.3
Que se curen por su cuenta	38 239	4.2	50 409	5.4	88 648	4.8
Otra	29 648	3.2	13 268	1.4	42 916	2.3

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A13**

Percepción de la población sobre opciones de rehabilitación para las personas con dependencia por grupos de edad. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 764 048		26-34 años 384 611		35-65 años 716 573	
	N	%	N	%	N	%
<b>Rehabilitación más efectiva para un adicto:</b>						
Que los metan en la cárcel	--	--	--	--	1 069	.1
Que los internen en hospitales psiquiátricos	114 061	15.1	35 575	9.4	41 513	5.8
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	564 289	74.8	244 117	64.6	559 618	78.5
Curarles en su propio ambiente	55 999	7.4	42 192	11.2	55 409	7.8
Que se curen por su cuenta	18 559	2.5	36 098	9.5	33 991	4.8
Otra	1 183	.2	20 056	5.3	21 677	3.0

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A14**

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud según sexo. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	Hombres 924 938		Mujeres 940 294		Total 1 865 232	
	N	%	N	%	N	%
<b>El consumo de drogas ilegales tiene relación con:</b>						
La violencia familiar y social	831 875	89.9	835 363	88.8	1 667 238	89.4
Los accidentes	870 437	94.1	849 917	90.4	1 720 354	92.2
<b>Sí una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA</b>	887 508	96.0	875 369	93.1	1 762 877	94.5
<b>Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA</b>	856 034	92.6	852 405	90.7	1 708 439	91.6

\*Porcentajes obtenidos según sexo definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A15**

Percepción de la población sobre el consumo de drogas y algunas consecuencias sociales y de salud por grupos de edad. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo	12-25 años 764 048		26-34 años 384 611		35-65 años 716 573	
	N	%	N	%	N	%
<b>El consumo de drogas ilegales tiene relación con:</b>						
La violencia familiar y social	674 098	88.2	346 723	90.1	646 417	90.2
Los accidentes	715 328	93.6	350 043	91.0	654 983	91.4
<b>Sí una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA</b>	730 023	95.5	374 378	97.3	658 476	91.9
<b>Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA</b>	699 747	91.6	365 247	95.0	643 445	89.8

\*Porcentajes obtenidos de la población total por edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A16**

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada según edad y sexo. Sinaloa, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
<b>Hombres</b>					
12 - 25	361 876	75 146	20.8	24 600	6.8
26 - 34	176 814	83 114	47.0	30 063	17.0
35 - 65	379 520	129 592	34.1	51 206	13.5
<b>Subtotal</b>	918 210	287 852	31.3	105 869	11.5
<b>Mujeres</b>					
12 - 25	352 138	8 895	2.5	964	.3
26 - 34	196 593	14 097	7.2	1 850	.9
35 - 65	398 283	19 869	5.0	5 073	1.3
<b>Subtotal</b>	947 014	42 861	4.5	7 887	.8
<b>Total</b>	1 865 224	330 713	17.7	113 756	6.1

\*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A17**

Población total de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada según edad y sexo. Sinaloa, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
<b>Hombres</b>					
12 – 25	361 876	86 793	24.0	29 719	8.2
26 – 34	176 814	88 100	49.8	36 834	20.8
35 – 65	379 520	141 423	37.3	58 509	15.4
<b>Subtotal</b>	<b>918 210</b>	<b>316 316</b>	<b>34.4</b>	<b>125 062</b>	<b>13.6</b>
<b>Mujeres</b>					
12 – 25	352 138	15 499	4.4	964	.3
26 – 34	196 593	15 399	7.8	1 850	.9
35 – 65	398 283	23 826	6.0	5 073	1.3
<b>Subtotal</b>	<b>947 014</b>	<b>54 724</b>	<b>5.8</b>	<b>7 887</b>	<b>.8</b>
<b>Total</b>	<b>1 865 224</b>	<b>371 040</b>	<b>19.9</b>	<b>132 949</b>	<b>7.1</b>

\*Porcentajes obtenidos para cada grupo según sexo y edad definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A18**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 12 a 25 años. Sinaloa, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	361 876	75 146	20.8	24 600	6.8
Mujeres	352 138	8 895	2.5	964	.3
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	407 193	37 597	9.2	12 658	3.1
No estudiante	306 821	46 444	15.1	12 906	4.2
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	131 916	12 048	9.1	6 310	4.8
Secundaria	249 694	15 112	6.1	5 156	2.1
Bachillerato o equivalente	212 545	37 575	17.7	5 710	2.7
Licenciatura	119 859	19 306	16.1	8 388	7.0
Posgrado	--	--	--	--	--
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	245 168	50 913	20.8	14 803	6.0
Ama de casa	70 725	--	--	--	--
Desempleado	398 121	33 128	8.3	10 761	2.7
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	289 964	39 907	13.8	10 816	3.7
De 3 a 6 salarios mínimos	329 979	27 922	8.5	11 378	3.4
Más de 6 salarios mínimos	85 383	16 212	19.0	3 370	3.9
<b>Vive con</b>					
Padre y madre	421 827	41 822	9.9	14 205	3.4
Sólo padre	6 308	1 579	25.0	--	--
Sólo madre	123 924	14 315	11.6	4 921	4.0
Otro	161 955	26 325	16.3	6 438	4.0

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A19**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 26 a 34 años. Sinaloa, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Marihuana regalada		Marihuana comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	176 814	83 114	47.0	30 063	17.0
Mujeres	196 593	14 097	7.2	1 850	.9
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	15 759	9 054	57.5	3 723	23.6
No estudiante	357 648	88 157	24.6	28 190	7.9
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	87 435	15 886	18.2	5 155	5.9
Secundaria	105 584	24 928	23.6	7 911	7.5
Bachillerato o equivalente	61 358	19 238	31.4	9 442	15.4
Licenciatura	114 273	36 013	31.5	8 259	7.2
Posgrado	4 757	1 146	24.1	1 146	24.1
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	263 443	90 421	34.3	31 913	12.1
Ama de casa	87 353	2 317	2.7	--	--
Desempleado	22 611	4 473	19.8	--	--
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	159 880	34 075	21.3	8 378	5.2
De 3 a 6 salarios mínimos	171 064	48 340	28.3	18 493	10.8
Más de 6 salarios mínimos	38 931	14 796	38.0	5 042	13.0
<b>Estado civil</b>					
Casado/unión libre	215 204	37 468	17.4	13 196	6.1
Separado/viudo/divorciado	20 202	3 987	19.7	897	4.4
Soltero	138 001	55 756	40.4	17 820	12.9

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A20**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios de 35 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Mariguana regalada		Mariguana comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	379 520	129 592	34.1	51 206	13.5
Mujeres	398 283	19 869	5.0	5 073	1.3
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	10 017	3 587	35.8	--	--
No estudiante	767 786	145 874	19.0	56 279	7.3
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	363 386	60 142	16.6	17 134	4.7
Secundaria	156 907	26 174	16.7	15 297	9.7
Bachillerato o equivalente	148 547	32 708	22.0	14 616	9.8
Licenciatura	100 598	24 719	24.6	5 502	5.5
Posgrado	8 365	5 718	68.4	3 730	44.6
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	510 087	135 205	26.5	52 437	10.3
Ama de casa	212 225	7 682	3.6	--	--
Desempleado	55 491	6 574	11.8	3 842	6.9
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	365 741	66 134	18.1	21 425	5.9
De 3 a 6 salarios mínimos	330 916	68 196	20.6	27 619	8.3
Más de 6 salarios mínimos	76 686	14 868	19.4	6 972	9.1
<b>Estado civil</b>					
Casado/unión libre	609 727	123 099	20.2	48 028	7.9
Separado/viudo/divorciado	94 049	16 056	17.1	5 085	5.4
Soltero	74 027	10 306	13.9	3 166	4.3

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A21**

Índice de exposición a drogas por características sociodemográficas de los usuarios. Sinaloa, México, 2008

Características sociodemográficas	N por grupo	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
		N	%	N	%
<b>Sexo</b>					
Hombres	918 210	316 316	34.4	125 062	13.6
Mujeres	947 014	54 724	5.8	7 887	.8
<b>Situación escolar</b>					
Estudiante	432 969	61 344	14.2	19 844	4.6
No estudiante	1 432 255	309 696	21.6	113 105	7.9
<b>Nivel de escolaridad</b>					
Ninguna/primaria	582 737	90 034	15.5	33 141	5.7
Secundaria	512 185	76 591	15.0	29 037	5.7
Bachillerato o equivalente	422 450	111 668	26.4	38 409	9.1
Licenciatura	334 730	85 110	25.4	27 486	8.2
Posgrado	13 122	7 637	58.2	4 876	37.2
<b>Situación laboral</b>					
Trabaja actualmente	1 018 698	308 353	30.3	114 883	11.3
Ama de casa	370 303	11 301	3.1	--	--
Desempleado	476 223	51 386	10.8	18 066	3.8
<b>Nivel de ingresos</b>					
Hasta 2 salarios mínimos	815 585	155 443	19.1	46 776	5.7
De 3 a 6 salarios mínimos	831 959	166 064	20.0	70 526	8.5
Más de 6 salarios mínimos	201 000	49 270	24.5	15 384	7.7
<b>Estado civil</b>					
Casado/unión libre	941 990	185 753	19.7	72 245	7.7
Separado/viudo/divorciado	124 875	27 033	21.6	8 577	6.9
Soltero	798 359	158 254	19.8	52 127	6.5
<b>Vive con</b>					
Padre y madre	549 795	93 286	17.0	35 661	6.5
Sólo padre	24 337	7 162	29.4	828	3.4
Sólo madre	191 443	35 111	18.3	8 823	4.6
Otro	1 099 649	235 481	21.4	87 637	8.0

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A22**

Incidencia acumulada para el uso de cualquier droga en la población total según edad y sexo. Sinaloa, México, 2008

Sexo/Edad	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
<b>Hombres</b>							
12 - 17	167 664	6 225	3.7	6 225	3.7	673	.4
18 - 34	371 026	42 945	11.6	39 859	10.7	5 400	1.5
35 - 65	379 520	34 731	9.2	34 731	9.2	5 029	1.3
<b>Subtotal</b>	<b>918 210</b>	<b>83 901</b>	<b>9.1</b>	<b>80 815</b>	<b>8.8</b>	<b>11 102</b>	<b>1.2</b>
<b>Mujeres</b>							
12 - 17	164 781	2 226	1.4	2 226	1.4	--	--
18 - 34	383 950	22 444	5.8	22 444	5.8	--	--
35 - 65	398 283	14 293	3.6	12 804	3.2	6 051	1.5
<b>Subtotal</b>	<b>947 014</b>	<b>38 963</b>	<b>4.1</b>	<b>37 474</b>	<b>4.0</b>	<b>6 051</b>	<b>.6</b>
<b>Total</b>	<b>1 865 224</b>	<b>122 864</b>	<b>6.6</b>	<b>118 289</b>	<b>6.3</b>	<b>17 153</b>	<b>.9</b>

\*Porcentajes obtenidos según sexo y edad definidos en los renglones para cada tipo de droga  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A23**

Incidencia acumulada del consumo de drogas según sexo en la población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo Drogas	Hombres 918 210		Mujeres 947 014		Total 1 865 224	
	N	%	N	%	N	%
<b>Opiáceos</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Tranquilizantes</b>	4 531	.5	3 734	.4	8 265	.4
<b>Sedantes</b>	--	--	4 562	.5	4 562	.2
<b>Anfetaminas o estimulantes</b>	6 571	.7	286	***	6 857	.4
<b>Mariguana</b>	48 932	5.3	22 282	2.4	71 214	3.8
<b>Cocaína**</b>	50 262	5.5	19 355	2.0	69 617	3.7
<b>Crack</b>	7 923	.9	4 168	.4	12 091	.6
<b>Alucinógenos</b>	3 574	.4	2 531	.3	6 105	.3
<b>Inhalables</b>	6 672	.7	2 531	.3	9 203	.5
<b>Heroína, opio</b>	2 598	.3	--	--	2 598	.1
<b>Estimulante tipo anfetamínico</b>	9 858	1.1	4 094	.4	13 952	.7
<b>Otras drogas</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Cualquier droga</b>	<b>83 901</b>	<b>9.1</b>	<b>38 963</b>	<b>4.1</b>	<b>122 864</b>	<b>6.6</b>
<b>Drogas ilegales</b>	<b>80 815</b>	<b>8.8</b>	<b>37 474</b>	<b>4.0</b>	<b>118 289</b>	<b>6.3</b>
<b>Drogas médicas</b>	<b>11 102</b>	<b>1.2</b>	<b>6 051</b>	<b>.6</b>	<b>17 153</b>	<b>.9</b>

\*Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo definido en las columnas

\*\*Cocaína también incluye crack

\*\*\*El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Cuadro A24**

Edad de inicio del consumo de drogas de los usuarios de cada sustancia. Sinaloa, México, 2008

Drogas	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más
	%	%	%	%
Opiáceos	--	--	--	--
Tranquilizantes	13.7	71.7	--	14.6
Sedantes	--	100.0	--	--
Anfetaminas o estimulantes	--	9.8	49.2	41.0
Mariguana	50.3	45.4	4.3	--
Cocaína	14.7	61.0	17.3	7.0
Crack	13.5	52.3	34.2	--
Alucinógenos	--	47.4	--	52.6
Inhalables	--	100.0	--	--
Heroína opio	--	100.0	--	--
Estimulante tipo anfetamínico	--	82.5	17.5	--
Otras drogas	--	--	--	--
Cualquier droga	35.8	52.5	7.6	4.1

\*Porcentajes obtenidos de los usuarios de cada sustancia  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A25**

Relación entre mecanismos involucrados en la exposición al uso de mariguana y otras drogas. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo Exposición	Mariguana 71 214		Otras drogas 90 542		Cualquier droga 122 864	
	N	%	N	%	N	%
	Sin exposición	9 891	.7	12 979	.9	18 781
Mariguana regalada	8 767	6.5	7 501	5.6	13 201	9.8
Otra droga regalada	--	--	8 750	27.5	8 750	27.5
Mariguana comprada	3 316	8.3	7 579	19.0	8 695	21.8
Otra droga comprada	--	--	2 647	28.8	2 647	28.8
Mariguana y otra droga regalada	37 811	25.7	40 494	27.5	59 361	40.3
Mariguana y otra droga comprada	--	--	--	--	--	--
Mariguana y otra droga regalada y comprada	11 429	54.7	10 592	50.7	11 429	54.7

\*Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A26**

Exposición a la prevención en la población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

N por subgrupo Lugar	12-25 años 714 014		26-34 años 373 407		35-65 años 777 803		Total 1 865 224	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	Expuestos a la prevención	427 895	59.9	145 417	38.9	238 085	30.6	811 397
En la escuela	374 089	87.4	40 488	27.8	51 547	21.7	466 124	57.4
En el trabajo	4 886	1.1	38 310	26.3	25 176	10.6	68 372	8.4
En la comunidad	30 198	7.1	42 691	29.4	104 534	43.9	177 423	21.9

\*Porcentajes obtenidos por grupo de edad definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A27**

Relación del perfil sociodemográfico y su impacto en el uso de drogas población de 12 a 25 años. Sinaloa, México, 2008

Exposición	N por grupo	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
<b>Situación escolar</b>							
Estudia actualmente	432 969	9 492	2.3	9 492	2.3	--	--
No estudia	1 432 255	19 048	6.2	19 048	6.2	673	.2
<b>Situación laboral</b>							
Trabaja	1 018 698	19 637	8.0	19 637	8.0	673	.3
Ama de casa	370 303	--	--	--	--	--	--
Desempleado	476 223	8 903	2.2	8 903	2.2	--	--
<b>Vive con</b>							
Padre y madre	549 795	4 982	1.2	4 982	1.2	--	--
Solo padre	24 337	1 098	17.4	1 098	17.4	--	--
Solo madre	191 443	8 049	6.5	8 049	6.5	--	--
Otro	1 099 649	14 411	8.9	14 411	8.9	673	.4
<b>Intento suicida</b>							
Con intento	7 449	--	--	--	--	--	--
Sin intento	756 599	31 809	4.2	31 809	4.2	--	--

\*Porcentajes de impacto en el uso de drogas obtenidos para cada grupo definido en los renglones  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A28**

Consumo de drogas y su relación con el consumo en el entorno en la población total de 12 a 25 años. Sinaloa, México, 2008

Exposición	N por grupo	Uso de drogas en el individuo					
		Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
		N	%	N	%	N	%
<b>Uso de drogas en el entorno</b>							
Mariguana	347 091	6 592	4.5	6 592	4.5	--	--
Cocaína	209 633	8 273	10.4	8 273	10.4	--	--
Heroína opio	25 159	5 770	36.4	5 770	36.4	--	--
Inhalables	43 021	--	--	--	--	--	--
Alucinógenos	7 788	--	--	--	--	--	--

\*Porcentajes obtenidos por tipo de droga consumida en el entorno definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A29**

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

	Total	
	N	%
<b>Dependencia</b>	12 657	.7
<b>Uso sin dependencia</b>	110 207	5.9
<b>Exposición a drogas sin consumo</b>	279 229	15.0
<b>No consumo</b>	1 463 131	78.4

\*Porcentajes obtenidos de cada tipo de necesidad en la población total definido en las columnas  
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

## Intervalos de confianza

**E**l intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de cocaína alguna vez entre hombres y mujeres, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de cocaína alguna vez en el cuadro de población masculina que en este caso sería 4.15%; después se busca el dato de cocaína alguna vez en el cuadro de población femenina, que es de 0.72%; de estos datos se elige el porcentaje más alto (población masculina) para considerar su columna de IC 95% (3.728-4.563); posteriormente se ubica si el valor más bajo (población femenina) está por arriba, por abajo o dentro de este intervalo de confianza.

Aquí se observa que 0.72% está por debajo de los intervalos que van de 3.728-4.563, por lo que podemos decir con una confianza de 95% que el nivel de consumo de cocaína alguna vez es más alto en los hombres en comparación con las mujeres.

Los intervalos de confianza también pueden servir para comparar distintos grupos de edad o bien entre distintas sustancias.

Se incluyen los intervalos de confianza nacionales para que cada estado pueda ver cómo se encuentra en relación con el país en general.

**Cuadro A30**

Consumo de drogas en la población total del país. Sinaloa, México, 2008

<b>Consumo alguna vez</b>	<b>%</b>	<b>IC95%</b>
Opiáceos	0.14	0.090-0.195
Tranquilizantes	0.58	0.480-0.675
Sedantes	0.18	0.111-0.246
Anfetaminas	0.30	0.223-0.378
Mariguana	4.19	3.885-4.493
Cocaína	2.37	2.146-2.588
Crack	0.59	0.483-0.707
Alucinógenos	0.35	0.270-0.437
Inhalables	0.71	0.592-0.829
Heroína	0.14	0.091-0.194
Metanfetaminas	0.49	0.394-0.585
Otra droga	0.06	0.029-0.098
Cualquier droga	5.72	5.364-6.078
Drogas médicas	1.03	0.890-1.163
Drogas ilegales	5.22	4.871-5.564
<b>Consumo último año</b>		
Opiáceos	0.06	0.023-0.095
Tranquilizantes	0.15	0.112-0.198
Sedantes	0.07	0.018-0.113
Anfetaminas	0.09	0.045-0.136
Mariguana	1.03	0.886-1.169
Cocaína	0.44	0.356-0.524
Crack	0.13	0.083-0.172
Alucinógenos	0.05	0.022-0.082
Inhalables	0.12	0.083-0.165
Heroína	0.04	0.019-0.065
Metanfetaminas	0.11	0.073-0.143
Otra droga	0.01	0.000-0.019
Cualquier droga	1.63	1.448-1.804
Drogas médicas	0.34	0.263-0.420
Drogas ilegales	1.40	1.234-1.566
<b>Consumo último mes</b>		
Opiáceos	0.01	0.000-0.017
Tranquilizantes	0.08	0.046-0.107
Sedantes	0.03	0.000-0.065
Anfetaminas	0.03	0.010-0.058
Mariguana	0.67	0.552-0.787
Cocaína	0.27	0.201-0.333
Crack	0.05	0.023-0.083
Alucinógenos	0.02	0.002-0.033
Inhalables	0.07	0.037-0.103
Heroína	0.01	0.000-0.021
Metanfetaminas	0.07	0.043-0.099
Otra droga	0.01	0.000-0.018
Cualquier droga	1.00	0.853-1.141
Drogas médicas	0.15	0.094-0.198
Drogas ilegales	0.90	0.761-1.038

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A31**

Consumo de drogas en la población masculina del país. Sinaloa, México, 2008

<b>Consumo alguna vez</b>	<b>%</b>	<b>IC95%</b>
Opiáceos	0.14	0.071-0.206
Tranquilizantes	0.75	0.581-0.910
Sedantes	0.25	0.126-0.365
Anfetaminas	0.44	0.292-0.587
Mariguana	7.19	6.634-7.741
Cocaína	4.15	3.728-4.563
Crack	1.03	0.810-1.244
Alucinógenos	0.59	0.441-0.730
Inhalables	1.28	1.042-1.511
Heroína	0.27	0.167-0.372
Metanfetaminas	0.79	0.617-0.969
Otra droga	0.10	0.033-0.166
Cualquier droga	9.13	8.501-9.755
Drogas médicas	1.27	1.055-1.484
Drogas ilegales	8.77	8.146-9.384
<b>Consumo último año</b>		
Opiáceos	0.03	0.000-0.059
Tranquilizantes	0.16	0.097-0.223
Sedantes	0.09	0.007-0.178
Anfetaminas	0.13	0.041-0.212
Mariguana	1.73	1.472-1.984
Cocaína	0.76	0.603-0.920
Crack	0.23	0.145-0.316
Alucinógenos	0.09	0.028-0.144
Inhalables	0.21	0.132-0.284
Heroína	0.08	0.034-0.116
Metanfetaminas	0.16	0.099-0.229
Otra droga	0.02	0.000-0.040
Cualquier droga	2.49	2.176-2.797
Drogas médicas	0.36	0.241-0.484
Drogas ilegales	2.33	2.028-2.633
<b>Consumo último mes</b>		
Opiáceos	0.01	0.000-0.013
Tranquilizantes	0.07	0.027-0.118
Sedantes	0.05	0.000-0.115
Anfetaminas	0.06	0.009-0.108
Mariguana	1.18	0.963-1.389
Cocaína	0.46	0.332-0.579
Crack	0.11	0.048-0.173
Alucinógenos	0.02	0.000-0.045
Inhalables	0.14	0.070-0.203
Heroína	0.02	0.000-0.044
Metanfetaminas	0.11	0.060-0.166
Otra droga	0.01	0.000-0.037
Cualquier droga	1.65	1.391-1.911
Drogas médicas	0.18	0.086-0.275
Drogas ilegales	1.57	1.313-1.822

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro A32**

Consumo de drogas en la población femenina del país. Sinaloa, México, 2008

<b>Consumo alguna vez</b>	<b>%</b>	<b>IC95%</b>
Opiáceos	0.15	0.066-0.226
Tranquilizantes	0.42	0.318-0.527
Sedantes	0.12	0.056-0.178
Anfetaminas	0.17	0.110-0.234
Mariguana	1.42	1.181-1.650
Cocaína	0.72	0.576-0.870
Crack	0.19	0.118-0.271
Alucinógenos	0.14	0.049-0.230
Inhalables	0.19	0.119-0.256
Heroína	0.02	0.000-0.052
Metanfetaminas	0.21	0.135-0.283
Otra droga	0.03	0.003-0.057
Cualquier droga	2.57	2.262-2.878
Drogas médicas	0.80	0.647-0.956
Drogas ilegales	1.94	1.660-2.215
<b>Consumo último año</b>		
Opiáceos	0.09	0.024-0.149
Tranquilizantes	0.15	0.092-0.209
Sedantes	0.04	0.000-0.085
Anfetaminas	0.06	0.019-0.096
Mariguana	0.38	0.255-0.502
Cocaína	0.14	0.079-0.206
Crack	0.03	0.000-0.064
Alucinógenos	0.02	0.000-0.044
Inhalables	0.05	0.012-0.081
Heroína	0.01	0.000-0.036
Metanfetaminas	0.06	0.025-0.086
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.83	0.661-1.001
Drogas médicas	0.32	0.221-0.423
Drogas ilegales	0.54	0.399-0.680
<b>Consumo último mes</b>		
Opiáceos	0.01	0.000-0.026
Tranquilizantes	0.08	0.040-0.122
Sedantes	0.01	0.000-0.030
Anfetaminas	0.01	0.002-0.020
Mariguana	0.20	0.105-0.298
Cocaína	0.09	0.037-0.147
Crack	0.00	0.000-0.002
Alucinógenos	0.02	0.000-0.035
Inhalables	0.01	0.000-0.017
Heroína	0.00	0.000-0.000
Metanfetaminas	0.03	0.009-0.055
Otra droga	0.00	0.000-0.000
Cualquier droga	0.39	0.273-0.511
Drogas médicas	0.11	0.068-0.162
Drogas ilegales	0.28	0.171-0.391

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

## Resultados estatales

### Cuadro B1

Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 435	.8	258 972	33.3
Baja California	6 119	.3	420 914	18.4
Baja California Sur	2 650	.6	125 068	30.4
Campeche	2 758	.5	159 776	28.5
Coahuila	12 239	.7	334 852	18.2
Colima	4 149	1.0	94 042	22.0
Chiapas	32 651	1.1	429 753	14.0
Chihuahua	38 797	1.6	650 901	27.3
Distrito Federal	19 578	.3	2 086 555	32.2
Durango	8 472	.8	250 263	23.7
Guanajuato	9 638	.3	733 743	21.5
Guerrero	12 360	.6	561 476	27.1
Hidalgo	24 135	1.4	498 757	29.8
Jalisco	72 715	1.5	1 497 921	31.1
Estado de México	50 145	.5	2 850 223	26.8
Michoacán	46 278	1.7	902 705	33.4
Morelos	11 394	1.0	409 116	35.6
Nayarit	8 419	1.3	221 084	32.9
Nuevo León	40 089	1.3	947 170	29.7
Oaxaca	24 813	1.0	531 783	22.3
Puebla	34 557	.9	1 127 782	29.4
Querétaro	25 062	2.1	374 771	31.1
Quintana Roo	18 316	1.9	287 795	30.4
San Luis Potosí	15 662	.9	399 486	23.9
Sinaloa	10 691	.6	469 343	25.2
Sonora	3 101	.2	504 802	28.6
Tabasco	14 683	1.0	369 327	25.6
Tamaulipas	14 111	.6	626 093	27.7
Tlaxcala	5 881	.8	249 721	32.0
Veracruz	22 298	.4	1 101 373	21.8
Yucatán	10 155	.8	261 287	19.3
Zacatecas	14 522	1.6	279 184	30.0
Nacional	622 873	.8	20 016 038	26.6

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B2**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población total de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	42 736	5.5	61 232	7.9
Baja California	113 508	5.0	34 615	1.5
Baja California Sur	27 705	6.7	21 492	5.2
Campeche	39 467	7.0	44 919	8.0
Coahuila	101 629	5.5	82 313	4.5
Colima	26 086	6.1	12 942	3.0
Chiapas	85 627	2.8	77 213	2.5
Chihuahua	218 191	9.2	112 518	4.7
Distrito Federal	287 497	4.4	364 085	5.6
Durango	72 254	6.8	65 541	6.2
Guanajuato	138 013	4.0	77 977	2.3
Guerrero	78 952	3.8	124 548	6.0
Hidalgo	109 552	6.6	114 527	6.8
Jalisco	309 877	6.4	273 703	5.7
Estado de México	481 829	4.5	621 799	5.8
Michoacán	155 019	5.7	209 659	7.8
Morelos	63 858	5.6	96 298	8.4
Nayarit	51 827	7.7	66 706	9.9
Nuevo León	303 269	9.5	158 254	5.0
Oaxaca	105 220	4.4	129 098	5.4
Puebla	152 070	4.0	296 095	7.7
Querétaro	87 535	7.3	104 334	8.7
Quintana Roo	76 222	8.0	66 162	7.0
San Luis Potosí	100 235	6.0	103 040	6.2
Sinaloa	106 197	5.7	90 975	4.9
Sonora	95 430	5.4	83 223	4.7
Tabasco	55 383	3.8	78 184	5.4
Tamaulipas	188 889	8.4	140 001	6.2
Tlaxcala	20 007	2.6	45 983	5.9
Veracruz	173 120	3.4	284 275	5.6
Yucatán	60 201	4.4	47 116	3.5
Zacatecas	59 056	6.4	79 236	8.5
Nacional	3 986 461	5.3	4 168 063	5.5

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008



**Cuadro B3**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	6 306	1.7	180 946	48.9
Baja California	5 280	.5	271 534	23.6
Baja California Sur	1 141	.5	86 504	41.1
Campeche	1 734	.6	112 232	40.9
Coahuila	11 905	1.3	245 299	27.0
Colima	2 982	1.4	63 474	30.4
Chiapas	31 232	2.1	300 586	20.2
Chihuahua	37 388	3.2	480 826	40.8
Distrito Federal	16 738	.6	1 277 221	42.0
Durango	8 335	1.6	190 757	37.6
Guanajuato	4 727	.3	510 442	32.2
Guerrero	11 867	1.2	401 325	41.1
Hidalgo	20 172	2.6	366 493	46.6
Jalisco	69 376	3.0	1 004 752	42.9
Estado de México	31 552	.6	1 950 777	38.0
Michoacán	31 268	2.5	613 879	48.7
Morelos	8 061	1.5	260 788	49.1
Nayarit	8 049	2.5	144 065	44.0
Nuevo León	33 502	2.1	751 569	47.5
Oaxaca	21 892	2.0	397 770	35.8
Puebla	27 203	1.5	825 845	45.9
Querétaro	23 062	4.0	262 724	45.9
Quintana Roo	16 132	3.4	192 220	40.1
San Luis Potosí	14 387	1.8	327 208	41.1
Sinaloa	10 691	1.2	357 780	39.0
Sonora	3 101	.4	405 620	46.2
Tabasco	10 647	1.5	274 443	39.2
Tamaulipas	14 111	1.3	510 860	46.1
Tlaxcala	4 590	1.2	178 545	48.1
Veracruz	22 298	.9	793 048	33.1
Yucatán	6 805	1.0	178 279	27.0
Zacatecas	11 255	2.6	211 752	48.4
Nacional	527 789	1.5	14 129 563	39.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B4**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población masculina de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	33 191	9.0	51 034	13.8
Baja California	89 612	7.8	27 555	2.4
Baja California Sur	21 712	10.3	17 201	8.2
Campeche	36 341	13.3	36 202	13.2
Coahuila	79 166	8.7	68 497	7.5
Colima	21 100	10.1	9 573	4.6
Chiapas	71 448	4.8	66 928	4.5
Chihuahua	190 179	16.2	99 550	8.5
Distrito Federal	209 327	6.9	252 788	8.3
Durango	66 327	13.1	56 450	11.1
Guanajuato	108 094	6.8	68 657	4.3
Guerrero	75 101	7.7	101 196	10.4
Hidalgo	92 479	11.8	95 800	12.2
Jalisco	241 366	10.3	217 356	9.3
Estado de México	407 199	7.9	500 463	9.7
Michoacán	129 889	10.3	180 891	14.4
Morelos	52 892	10.0	79 095	14.9
Nayarit	41 264	12.6	56 464	17.2
Nuevo León	283 719	17.9	153 774	9.7
Oaxaca	102 373	9.2	120 929	10.9
Puebla	127 473	7.1	266 885	14.8
Querétaro	71 966	12.6	80 863	14.1
Quintana Roo	62 349	13.0	57 542	12.0
San Luis Potosí	93 093	11.7	94 076	11.8
Sinaloa	85 687	9.3	83 186	9.1
Sonora	89 382	10.2	68 055	7.7
Tabasco	45 586	6.5	64 691	9.2
Tamaulipas	173 078	15.6	128 379	11.6
Tlaxcala	15 424	4.2	41 602	11.2
Veracruz	149 262	6.2	243 318	10.2
Yucatán	50 745	7.7	40 271	6.1
Zacatecas	50 169	11.5	68 675	15.7
Nacional	3 366 993	9.3	3 497 946	9.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B5**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Estados	Consumo diario		Bebedores altos	
	N	%	N	%
Aguascalientes	129	***	78 026	19.1
Baja California	839	.1	149 380	13.1
Baja California Sur	1 509	.7	38 564	19.2
Campeche	1 024	.4	47 544	16.6
Coahuila	334	***	89 553	9.6
Colima	1 167	.5	30 568	13.9
Chiapas	1 419	.1	129 167	8.1
Chihuahua	1 409	.1	170 075	14.1
Distrito Federal	2 840	.1	809 334	23.5
Durango	137	***	59 506	10.9
Guanajuato	4 911	.3	223 301	12.2
Guerrero	493	***	160 151	14.6
Hidalgo	3 963	.4	132 264	14.9
Jalisco	3 339	.1	493 169	19.9
Estado de México	18 593	.3	899 446	16.3
Michoacán	15 010	1.0	288 826	20.0
Morelos	3 333	.5	148 328	24.0
Nayarit	370	.1	77 019	22.4
Nuevo León	6 587	.4	195 601	12.2
Oaxaca	2 921	.2	134 013	10.6
Puebla	7 354	.4	301 937	14.9
Querétaro	2 000	.3	112 047	17.8
Quintana Roo	2 184	.5	95 575	20.4
San Luis Potosí	1 275	.1	72 278	8.2
Sinaloa	--	--	111 563	11.8
Sonora	--	--	99 182	11.2
Tabasco	4 036	.5	94 884	12.8
Tamaulipas	--	--	115 233	10.0
Tlaxcala	1 291	.3	71 176	17.4
Veracruz	--	--	308 325	11.6
Yucatán	3 350	.5	83 008	12.0
Zacatecas	3 267	.7	67 432	13.7
Nacional	95 084	.2	5 886 475	15.1

\*\*\* El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

**Cuadro B6**

Prevalencia de alcohol por entidad. Población femenina de 12 a 65 años. Sinaloa, México, 2008

Estados	Consuetudinarios		Abuso/Dependencia	
	N	%	N	%
Aguascalientes	9 545	2.3	10 198	2.5
Baja California	23 896	2.1	7 060	.6
Baja California Sur	5 993	3.0	4 291	2.1
Campeche	3 126	1.1	8 717	3.0
Coahuila	22 463	2.4	13 816	1.5
Colima	4 986	2.3	3 369	1.5
Chiapas	14 179	.9	10 285	.6
Chihuahua	28 012	2.3	12 968	1.1
Distrito Federal	78 170	2.3	111 297	3.2
Durango	5 927	1.1	9 091	1.7
Guanajuato	29 919	1.6	9 320	.5
Guerrero	3 851	.4	23 352	2.1
Hidalgo	17 073	1.9	18 727	2.1
Jalisco	68 511	2.8	56 347	2.3
Estado de México	74 630	1.4	121 336	2.2
Michoacán	25 130	1.7	28 768	2.0
Morelos	10 966	1.8	17 203	2.8
Nayarit	10 563	3.1	10 242	3.0
Nuevo León	19 550	1.2	4 480	.3
Oaxaca	2 847	.2	8 169	.6
Puebla	24 597	1.2	29 210	1.4
Querétaro	15 569	2.5	23 471	3.7
Quintana Roo	13 873	3.0	8 620	1.8
San Luis Potosí	7 142	.8	8 964	1.0
Sinaloa	20 510	2.2	7 789	.8
Sonora	6 048	.7	15 168	1.7
Tabasco	9 797	1.3	13 493	1.8
Tamaulipas	15 811	1.4	11 622	1.0
Tlaxcala	4 583	1.1	4 381	1.1
Veracruz	23 858	.9	40 957	1.5
Yucatán	9 456	1.4	6 845	1.0
Zacatecas	8 887	1.8	10 561	2.1
Nacional	619 468	1.6	670 117	1.7

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

## Intervalos de confianza

### Cuadro B7

Intervalos de confianza de la población total del país. Sinaloa, México, 2008

	Población total		Hombres		Mujeres	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Consumo diario	0.8	0.706-0.952	1.5	1.227-1.697	0.2	0.158-0.330
Consumo alto	26.6	25.917-27.370	39.1	38.066-40.229	15.1	14.261-15.902
Bebedores consuetudinarios	5.3	4.954-5.658	9.3	8.671-9.986	1.6	1.325-1.849
Abuso/dependencia	5.5	5.196-5.900	9.7	9.038-10.345	1.7	1.454-1.980

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

# C. Estadísticas de fuentes estatales sobre antecedentes de consumo de drogas\*

## Cuadro C1

Perfil sociodemográfico de la población global que acuden a los centros de tratamiento SISVEA. Sinaloa, México

Características	Global	1994	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	N = 27570	n=190	n=299	n=55	n=523	n=541	n=594	n=1260	n=2375	n=4070	n=5988	n=6486	n=5189
<b>Sexo</b>													
Masculino	90.7	97.9	69.5	96.4	86.7	87.8	92.6	96.3	88.4	90.1	92.0	91.7	89.3
Femenino	9.3	2.1	30.5	3.6	13.3	12.2	7.4	3.7	11.6	9.9	8.0	8.3	10.7
<b>Edad</b>													
5 - 9 años	0.1	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	0.9	2.1	5.7	5.5	1.3	2.4	4.2	1.4	1.0	0.6	0.3	0.7	0.7
15 - 19 años	13.8	17.4	15.8	23.6	18.2	15.5	17.5	14.1	14.6	13.7	13.7	12.8	13.1
20 - 24 años	20.8	24.2	21.5	20.0	17.1	26.2	23.4	23.6	21.7	21.5	20.9	20.6	18.5
25 - 29 años	19.5	21.1	17.5	23.6	20.5	20.3	22.4	22.3	20.5	19.8	19.5	19.6	17.4
30 - 34 años	16.2	16.3	12.1	12.7	17.6	15.9	14.6	17.5	17.9	16.5	16.4	15.7	15.6
35 años o más	28.9	18.9	23.6	14.5	25.3	19.6	17.8	20.9	24.3	27.9	29.1	30.5	34.7
<b>Escolaridad</b>													
Sin escolaridad	2.9	2.1	1.7	0.0	1.0	3.0	3.7	2.3	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1
Primaria	29.4	20.5	31.4	23.6	17.1	31.3	39.2	36.2	29.6	29.5	30.0	28.2	28.2
Tec. post-primaria	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.3	0.2	0.6	0.7	0.4	0.2	0.6
Secundaria	36.3	45.3	33.8	40.0	32.8	39.3	38.5	38.9	36.2	34.4	36.1	37.8	34.9
Tec. post-secundaria	1.0	3.7	0.0	1.8	1.5	0.9	1.4	1.0	1.2	1.5	1.2	0.4	0.8
Bachillerato	22.3	19.5	28.4	25.5	26.8	18.1	14.5	18.4	19.9	20.6	21.3	24.4	24.7
Licenciatura	7.2	8.9	4.7	9.1	19.3	6.9	2.4	2.9	9.3	9.5	7.3	5.4	6.9
Posgrado	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.5	0.8	0.7	0.4	0.9
<b>Estado civil</b>													
Soltero	52.8	62.2	54.8	54.5	49.3	54.0	56.3	55.8	50.4	54.4	52.3	52.6	51.9
Casado	26.6	28.7	33.1	32.7	33.7	27.3	25.3	27.2	26.7	26.2	26.6	25.6	26.7
Divorciado	3.6	1.1	2.7	0.0	4.4	1.7	1.3	2.6	3.9	3.2	3.9	4.0	3.7
Separado	5.8	1.6	2.3	5.5	4.4	5.6	4.9	3.8	5.9	5.0	5.8	6.6	6.8
Viudo	0.7	0.5	1.7	0.0	0.8	0.4	0.2	0.3	0.9	0.7	0.7	0.6	0.9
Unión libre	10.5	5.9	5.4	7.3	7.3	11.1	12.0	10.2	12.1	10.5	10.7	10.7	10.0
<b>Situación laboral</b>													
Estudiante	4.1	0.0	0.0	11.1	6.5	3.4	6.1	3.6	4.8	4.0	3.8	3.5	4.5
Desempleado	22.5	0.0	0.0	11.1	11.2	7.5	8.0	20.9	21.5	23.8	21.7	26.7	22.6
Desocupado	13.1	0.0	0.0	33.3	20.4	18.8	16.2	10.0	12.0	11.1	13.5	13.4	13.0
Trabajo fijo	26.2	0.0	0.0	33.3	51.3	32.9	23.8	31.3	27.7	29.6	25.0	22.8	24.4
Trabajo ocasional	31.3	0.0	0.0	11.1	5.7	35.3	44.3	32.7	30.3	28.8	33.6	31.2	32.0
Ama de casa	2.3	0.0	0.0	0.0	4.5	1.7	1.1	1.2	3.3	2.3	2.1	2.0	2.8
Jubilado	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7
<b>Acudió</b>													
En forma voluntaria	64.2	60.8	61.7	79.6	85.8	62.1	59.9	50.8	57.7	60.9	61.4	68.7	69.0
Por amigos o familia	23.8	27.0	28.2	13.0	11.1	6.7	12.5	19.8	24.7	28.4	27.4	21.0	24.0
Por indicación legal	8.9	10.1	10.1	7.4	2.3	29.6	25.1	13.3	14.2	7.8	9.0	7.7	4.3
Por indicación médica	0.4	2.1	0.0	0.0	0.8	1.1	0.2	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	0.5
Otros	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	15.5	2.8	2.8	1.8	2.2	2.3

\* Los cuadros de este anexo provienen de los reportes de SISVEA y de los de CIJ

**Cuadro C2.A**

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de inicio, SISVEA. Sinaloa, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhales		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. Ilícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Sexo</b>																										
Masculino	4632	100	1366	29.5	1513	32.7	91	2.0	970	20.9	34	0.7	422	9.1	27	0.6	180	3.9	17	0.4	0	0.0	9	0.2	3	0.1
Femenino	557	100	54	9.7	210	37.7	5	0.9	186	33.4	22	3.9	36	6.5	1	0.2	38	6.8	1	0.2	0	0.0	4	0.7	0	0.0
<b>Edad</b>																										
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	37	100	15	40.5	8	21.6	3	8.1	8	21.6	1	2.7	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	679	100	241	35.5	157	23.1	14	2.1	154	22.7	15	2.2	35	5.2	1	0.1	59	8.7	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1
20 - 24 años	961	100	315	32.8	235	24.5	18	1.9	199	20.7	6	0.6	117	12.2	4	0.4	62	6.5	3	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0
25 - 29 años	905	100	255	28.2	253	28.0	19	2.1	211	23.3	6	0.7	117	12.9	4	0.4	37	4.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0
30 - 34 años	807	100	211	26.1	263	32.6	13	1.6	174	21.6	6	0.7	91	11.3	8	1.0	35	4.3	3	0.4	0	0.0	1	0.1	2	0.2
35 años o más	1800	100	383	21.3	807	44.8	29	1.6	410	22.8	22	1.2	96	5.3	11	0.6	25	1.4	9	0.5	0	0.0	8	0.4	0	0.0
<b>Escolaridad</b>																										
Sin escolaridad	159	100	37	23.3	60	37.7	3	1.9	32	20.1	0	0.0	10	6.3	3	1.9	13	8.2	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	1463	100	443	30.3	406	27.8	51	3.5	366	25.0	14	1.0	105	7.2	4	0.3	66	4.5	4	0.3	0	0.0	3	0.2	1	0.1
Tec. post-primaria	29	100	11	37.9	7	24.1	0	0.0	9	31.0	0	0.0	1	3.4	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	1811	100	590	32.6	482	26.6	30	1.7	415	22.9	22	1.2	161	8.9	9	0.5	89	4.9	7	0.4	0	0.0	4	0.2	2	0.1
Tec. post-secundaria	44	100	3	6.8	21	47.7	0	0.0	18	40.9	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Bachillerato	1279	100	303	23.7	473	37.0	11	0.9	247	19.3	16	1.3	160	12.5	11	0.9	48	3.8	6	0.5	0	0.0	4	0.3	0	0.0
Licenciatura	356	100	31	8.7	243	68.3	1	0.3	58	16.3	3	0.8	17	4.8	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
Posgrado	46	100	1	2.2	31	67.4	0	0.0	10	21.7	1	2.2	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
<b>Estado civil</b>																										
Soltero	2690	100	899	33.4	744	27.7	66	2.5	567	21.1	30	1.1	215	8.0	12	0.4	142	5.3	7	0.3	0	0.0	5	0.2	3	0.1
Casado	1385	100	256	18.5	586	42.3	8	0.6	327	23.6	13	0.9	143	10.3	5	0.4	39	2.8	3	0.2	0	0.0	5	0.4	0	0.0
Divorciado	192	100	39	20.3	85	44.3	5	2.6	29	15.1	3	1.6	20	10.4	3	1.6	4	2.1	3	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0
Separado	354	100	83	23.4	134	37.9	8	2.3	83	23.4	3	0.8	25	7.1	7	2.0	7	2.0	2	0.6	0	0.0	2	0.6	0	0.0
Viudo	48	100	4	8.3	21	43.8	1	2.1	14	29.2	1	2.1	3	6.3	0	0.0	3	6.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	519	100	139	26.8	153	29.5	8	1.5	136	26.2	6	1.2	51	9.8	1	0.2	23	4.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Situación laboral</b>																										
Estudiante	235	100	53	22.6	109	46.4	0	0.0	44	18.7	6	2.6	14	6.0	0	0.0	8	3.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
Desempleado	1169	100	364	31.1	302	25.8	25	2.1	254	21.7	20	1.7	116	9.9	13	1.1	69	5.9	4	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.1
Desocupado	670	100	216	32.2	226	33.7	24	3.6	98	14.6	7	1.0	54	8.1	1	0.1	41	6.1	2	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0
Trabajo fijo	1263	100	205	16.2	619	49.0	10	0.8	243	19.2	9	0.7	132	10.5	2	0.2	35	2.8	3	0.2	0	0.0	5	0.4	0	0.0
Trabajo ocasional	1654	100	570	34.5	388	23.5	36	2.2	435	26.3	9	0.5	131	7.9	12	0.7	59	3.6	9	0.5	0	0.0	3	0.2	2	0.1
Ama de casa	145	100	6	4.1	49	33.8	1	0.7	70	48.3	5	3.4	9	6.2	0	0.0	4	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
Jubilado	36	100	2	5.6	19	52.8	0	0.0	12	33.3	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
<b>Acudió</b>																										
En forma voluntaria	3580	100	952	26.6	1173	32.8	70	2.0	810	22.6	35	1.0	342	9.6	21	0.6	153	4.3	13	0.4	0	0.0	10	0.3	1	0.0
Por amigos o familia	1244	100	354	28.5	421	33.8	21	1.7	264	21.2	15	1.2	104	8.4	5	0.4	55	4.4	2	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.2
Por indicación legal	221	100	60	27.1	72	32.6	4	1.8	69	31.2	1	0.5	6	2.7	1	0.5	5	2.3	2	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0
Por indicación médica	27	100	1	3.7	11	40.7	0	0.0	10	37.0	5	18.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros	117	100	53	45.3	46	39.3	1	0.9	3	2.6	0	0.0	6	5.1	1	0.9	5	4.3	1	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0

\* Cocaína. Basuco. Crack

\*\* Barbitúricos. Anticolinérgicos. Antidepresivos

\*\*\* Alucinógenos. Otros psicotrópicos

Cuadro C2.B

Patrón de consumo de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de inicio, SISVEA. Sinaloa, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. lícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Frecuencia actual</b>																										
Diario	3488	100	1163	33.3	686	19.7	74	2.1	1041	29.8	37	1.1	263	7.5	26	0.7	172	4.9	14	0.4	0	0.0	9	0.3	3	0.1
2 - 3 veces por semana	465	100	71	15.3	307	66.0	6	1.3	22	4.7	5	1.1	35	7.5	1	0.2	16	3.4	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0
1 vez por semana	596	100	60	10.1	402	67.4	4	0.7	18	3.0	3	0.5	92	15.4	1	0.2	14	2.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 - 3 veces por mes	433	100	66	15.2	231	53.3	9	2.1	71	16.4	6	1.4	36	8.3	0	0.0	11	2.5	2	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0
1-11 veces al año	207	100	60	29.0	97	46.9	3	1.4	4	1.9	5	2.4	32	15.5	0	0.0	5	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
<b>Edad de inicio</b>																										
9 años o menos	207	100	52	25.1	80	38.6	9	4.3	59	28.5	0	0.0	4	1.9	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
10 - 14 años	2073	100	699	33.7	552	26.6	67	3.2	544	26.2	23	1.1	132	6.4	3	0.1	42	2.0	6	0.3	0	0.0	4	0.2	1	0.1
15 - 19 años	2270	100	588	25.9	842	37.1	17	0.7	473	20.8	19	0.8	218	9.6	12	0.5	87	3.8	8	0.4	0	0.0	4	0.2	2	0.1
20 - 24 años	402	100	60	14.9	161	40.1	2	0.5	58	14.4	1	0.2	58	14.4	6	1.5	52	12.9	3	0.7	0	0.0	1	0.2	0	0.0
25 - 29 años	137	100	15	10.9	51	37.2	0	0.0	11	8.0	5	3.6	30	21.9	2	1.5	23	16.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30 - 34 años	48	100	5	10.4	18	37.5	0	0.0	4	8.3	2	4.2	6	12.5	5	10.4	7	14.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
35 años o más	51	100	1	2.0	19	37.3	0	0.0	7	13.7	6	11.8	10	19.6	0	0.0	6	11.8	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	0.0

\* Cocaína. Basuco. Crack  
 \*\* Barbitúricos. Anticolinérgicos. Antidepresivos  
 \*\*\* Alucinógenos. Otros psicotrópicos

Cuadro C3.A

Perfil sociodemográfico de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de impacto, SISVEA. Sinaloa, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. lícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
<b>Sexo</b>																										
Masculino	4632	100	363	7.8	779	16.8	51	1.1	124	2.7	64	1.4	772	16.7	298	6.4	2135	46.1	27	0.6	1	0.0	13	0.3	5	0.1
Femenino	557	100	26	4.7	118	21.2	3	0.5	69	12.4	39	7.0	63	11.3	19	3.4	214	38.4	2	0.4	0	0.0	4	0.7	0	0.0
<b>Edad</b>																										
5 - 9 años	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	37	100	7	18.9	7	18.9	2	5.4	3	8.1	1	2.7	4	10.8	0	0.0	13	35.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 - 19 años	679	100	89	13.1	63	9.3	16	2.4	8	1.2	17	2.5	83	12.2	14	2.1	379	55.8	5	0.7	0	0.0	1	0.1	4	0.6
20 - 24 años	961	100	93	9.7	91	9.5	11	1.1	12	1.2	15	1.6	142	14.8	43	4.5	549	57.1	3	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0
25 - 29 años	905	100	55	6.1	72	8.0	11	1.2	26	2.9	9	1.0	149	16.5	70	7.7	504	55.7	7	0.8	1	0.1	1	0.1	0	0.0
30 - 34 años	807	100	54	6.7	100	12.4	4	0.5	13	1.6	11	1.4	145	18.0	58	7.2	416	51.5	5	0.6	0	0.0	1	0.1	0	0.0
35 años o más	1800	100	91	5.1	564	31.3	10	0.6	131	7.3	50	2.8	312	17.3	132	7.3	488	27.1	9	0.5	0	0.0	12	0.7	1	0.1
<b>Escolaridad</b>																										
Sin escolaridad	159	100	14	8.8	49	30.8	1	0.6	13	8.2	0	0.0	7	4.4	11	6.9	62	39.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Primaria	1463	100	116	7.9	254	17.4	25	1.7	51	3.5	22	1.5	172	11.8	98	6.7	714	48.8	8	0.5	0	0.0	2	0.1	1	0.1
Tec. post-primaria	29	100	2	6.9	7	24.1	0	0.0	5	17.2	0	0.0	4	13.8	2	6.9	9	31.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Secundaria	1811	100	142	7.8	219	12.1	18	1.0	50	2.8	32	1.8	261	14.4	115	6.4	957	52.8	13	0.7	0	0.0	3	0.2	1	0.1
Tec. post-secundaria	44	100	0	0.0	12	27.3	0	0.0	5	11.4	3	6.8	10	22.7	1	2.3	12	27.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
Bachillerato	1279	100	90	7.0	189	14.8	8	0.6	42	3.3	22	1.7	279	21.8	81	6.3	553	43.2	5	0.4	1	0.1	6	0.5	3	0.2
Licenciatura	356	100	21	5.9	143	40.2	2	0.6	25	7.0	20	5.6	90	25.3	9	2.5	41	11.5	1	0.3	0	0.0	4	1.1	0	0.0
Posgrado	46	100	3	6.5	23	50.0	0	0.0	2	4.3	4	8.7	12	26.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
<b>Estado civil</b>																										
Soltero	2690	100	270	10.0	354	13.2	45	1.7	44	1.6	50	1.9	354	13.2	181	6.7	1367	50.8	15	0.6	0	0.0	6	0.2	4	0.1
Casado	1385	100	49	3.5	340	24.5	5	0.4	102	7.4	31	2.2	293	21.2	65	4.7	486	35.1	6	0.4	1	0.1	7	0.5	0	0.0
Divorciado	192	100	10	5.2	41	21.4	1	0.5	5	2.6	7	3.6	47	24.5	11	5.7	66	34.4	3	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0
Separado	354	100	15	4.2	63	17.8	3	0.8	11	3.1	5	1.4	74	20.9	24	6.8	155	43.8	1	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.3
Viudo	48	100	1	2.1	19	39.6	0	0.0	8	16.7	4	8.3	4	8.3	1	2.1	10	20.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Unión libre	519	100	44	8.5	79	15.2	0	0.0	23	4.4	6	1.2	63	12.1	35	6.7	265	51.1	3	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0
<b>Situación laboral</b>																										
Estudiante	235	100	41	17.4	64	27.2	2	0.9	8	3.4	5	2.1	45	19.1	5	2.1	59	25.1	3	1.3	0	0.0	1	0.4	2	0.9
Desempleado	1169	100	70	6.0	143	12.2	18	1.5	14	1.2	22	1.9	159	13.6	88	7.5	645	55.2	7	0.6	0	0.0	2	0.2	1	0.1
Desocupado	670	100	69	10.3	94	14.0	12	1.8	3	0.4	7	1.0	84	12.5	53	7.9	344	51.3	2	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.1
Trabajo fijo	1263	100	53	4.2	326	25.8	8	0.6	79	6.3	37	2.9	302	23.9	50	4.0	395	31.3	6	0.5	0	0.0	7	0.6	0	0.0
Trabajo ocasional	1654	100	151	9.1	219	13.2	14	0.8	49	3.0	20	1.2	220	13.3	117	7.1	849	51.3	10	0.6	1	0.1	3	0.2	1	0.1
Ama de casa	145	100	2	1.4	30	20.7	0	0.0	31	21.4	11	7.6	16	11.0	4	2.8	50	34.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
Jubilado	36	100	2	5.6	17	47.2	0	0.0	9	25.0	1	2.8	4	11.1	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0
<b>Acudió</b>																										
En forma voluntaria	3580	100	221	6.2	606	16.9	37	1.0	159	4.4	80	2.2	603	16.8	240	6.7	1596	44.6	21	0.6	1	0.0	12	0.3	4	0.1
Por amigos o familia	1244	100	111	8.9	230	18.5	17	1.4	14	1.1	14	1.1	163	13.1	68	5.5	616	49.5	6	0.5	0	0.0	4	0.3	1	0.1
Por indicación legal	221	100	46	20.8	26	11.8	0	0.0	12	5.4	2	0.9	49	22.2	4	1.8	80	36.2	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
Por indicación médica	27	100	1	3.7	8	29.6	0	0.0	8	29.6	6	22.2	2	7.4	0	0.0	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros	117	100	10	8.5	27	23.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	18													



**Cuadro C3.B**

Patrón de consumo de la población global que acude a los centros de tratamiento no gubernamentales según droga de impacto, SISVEA. Sinaloa, México, 2007

Características	Global		Marihuana		Alcohol		Inhalables		Tabaco		Tranq.		Cocaína *		Heroína		Cristal		Rohypnol		Refractil		D. Médicas**D. Ilícitas***			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Frecuencia actual</b>																										
Diario	4025	100	342	8.5	495	12.3	47	1.2	183	4.5	77	1.9	559	13.9	301	7.5	1986	49.3	17	0.4	1	0.0	13	0.3	4	0.1
2 - 3 veces por semana	418	100	21	5.0	149	35.6	3	0.7	4	1.0	3	0.7	81	19.4	2	0.5	149	35.6	4	1.0	0	0.0	2	0.5	0.0	0.0
1 vez por semana	406	100	9	2.2	141	34.7	3	0.7	3	0.7	4	1.0	115	28.3	7	1.7	119	29.3	3	0.7	0	0.0	1	0.2	1	0.2
1 - 3 veces por mes	265	100	13	4.9	86	32.5	1	0.4	3	1.1	14	5.3	64	24.2	5	1.9	73	27.5	5	1.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0
1- 11 veces al año	75	100	4	5.3	26	34.7	0	0.0	0	0.0	5	6.7	16	21.3	2	2.7	22	29.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>Edad de inicio</b>																										
5 - 9 años	207	100	17	8.2	30	14.5	7	3.4	5	2.4	3	1.4	30	14.5	23	11.1	91	44.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 - 14 años	2073	100	191	9.2	267	12.9	28	1.4	49	2.4	43	2.1	272	13.1	181	8.7	1018	49.1	15	0.7	1	0.1	4	0.2	4	0.2
15 - 19 años	2270	100	164	7.2	439	19.3	17	0.7	99	4.4	33	1.5	405	17.8	91	4.0	999	44.0	12	0.5	0	0.0	10	0.4	1	0.0
20 - 24 años	402	100	9	2.2	94	23.4	2	0.5	32	8.0	8	2.0	81	20.1	12	3.0	163	40.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 - 29 años	137	100	6	4.4	36	26.3	0	0.0	3	2.2	4	2.9	31	22.6	4	2.9	53	38.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30 - 34 años	48	100	2	4.2	15	31.2	0	0.0	1	2.1	2	4.2	9	18.8	6	12.5	12	25.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
35 años o más	51	100	0	0.0	16	31.4	0	0.0	4	7.8	10	19.6	6	11.8	0	0.0	13	25.5	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	0.0
<b>Droga de inicio</b>																										
Alcohol	1723	100	92	5.3	693	40.2	8	0.5	22	1.3	37	2.1	364	21.1	36	2.1	461	26.8	4	0.2	0	0.0	6	0.3	0	0.0
Marihuana	1420	100	207	14.6	59	4.2	23	1.6	1	0.1	21	1.5	142	10.0	145	10.2	798	56.2	16	1.1	1	0.1	4	0.3	3	0.2
Inhalables	96	100	2	2.1	4	4.2	13	13.5	0	0.0	3	3.1	7	7.3	9	9.4	57	59.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alucinógenos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Heroína	28	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	24	85.7	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
Opio-Morfina y deriv.	3	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0
Cocaína	455	100	11	2.4	14	3.1	2	0.4	0	0.0	5	1.1	164	36.0	17	3.7	242	53.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tranquilizantes	56	100	1	1.8	4	7.1	1	1.8	0	0.0	19	33.9	5	8.9	4	7.1	22	39.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Barbitúricos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Anfetaminas	10	100	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	60.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0
Anticolinérgicos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tabaco	1156	100	72	6.2	121	10.5	7	0.6	170	14.7	17	1.5	143	12.4	80	6.9	542	46.9	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1
Antidepresivos	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros psicotrópicos	3	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
Basuco o pasta base	3	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Cristal	218	100	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.8	1	0.5	209	95.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Flunitrazepan (Rohypnol)	18	100	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	0	0.0	8	44.4	5	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Crack	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Refractil Ofteno	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

\* Cocaína. Basuco. Crack

\*\* Barbitúricos. Anticolinérgicos. Antidepresivos

\*\*\* Alucinógenos. Otros psicotrópicos

**Cuadro C4**

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas. Sinaloa, México, 2007

Características	Global	Mariguana	Inhalables	Alcohol	Cocaína	Heroína	Tabaco	Cristal
	n=620	n=279	n=46	n=50	n=38	n=2	n=81	n=126
<b>Sexo</b>								
Masculino	96.0	96.8	89.1	98.0	97.4	100.0	96.3	94.4
Femenino	4.0	3.2	10.9	2.0	2.6	0.0	3.7	5.6
<b>Edad</b>								
5 - 9 Años	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 Años	16.0	10.4	30.4	10.0	2.6	0.0	12.3	8.7
15 - 18 Años	83.9	89.6	69.6	90.0	97.4	100.0	87.7	91.3
<b>Escolaridad</b>								
Primaria	43.5	50.2	78.3	52.0	50.0	0.0	55.6	51.6
Secundaria	45.6	43.4	13.0	34.0	44.7	100.0	37.0	42.1
Prepa	9.2	5.4	4.3	14.0	5.3	0.0	3.7	4.8
Licenciatura o posgrado	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No estudio	1.5	1.1	4.3	0.0	0.0	0.0	3.7	1.6
<b>Ocupación</b>								
Estudiante	13.9	6.5	0.0	10.0	7.9	0.0	8.6	4.0
Empleado	19.8	26.9	23.9	20.0	13.2	0.0	13.6	18.3
Subempleado	31.5	29.4	21.7	58.0	39.5	50.0	55.6	31.7
Hogar	0.5	0.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.6
Ninguna	34.4	36.6	54.3	12.0	36.8	50.0	22.2	44.4
<b>Usa tatuajes</b>								
Sí	12.7	22.2	13.0	20.0	28.9	50.0	24.7	23.8
No	87.3	77.8	87.0	80.0	71.1	50.0	75.3	76.2
<b>Ha pertenecido a una banda</b>								
Sí	7.9	11.1	17.4	4.0	10.5	50.0	6.2	19.1
No	92.1	88.9	82.6	96.0	89.5	50.0	93.8	81.0
<b>Infracción bajo intoxicación</b>								
Sí	5.2	9.7	6.7	8.0	13.2	0.0	8.6	12.7
No	94.8	90.3	93.3	92.0	86.8	100.0	91.4	87.3
<b>Tipo de infracción</b>								
Robo	42.1	40.9	17.4	70.0	63.2	100.0	64.2	54.8
Viólación	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Homicidio	2.3	1.4	0.0	6.0	0.0	0.0	7.4	0.8
Lesiones a terceros	3.4	3.2	2.2	4.0	5.3	0.0	1.2	3.2
Daños en propiedad ajena	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
Secuestro	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Delitos contra la salud	9.4	11.5	2.2	16.0	21.1	0.0	18.5	4.0
Consumo de drogas	10.6	16.8	56.5	0.0	5.3	0.0	0.0	10.3
Portación de arma	8.2	7.2	4.3	2.0	2.6	0.0	4.9	10.3
Otros	21.8	19.4	26.1	2.0	7.9	0.0	2.5	18.3
<b>Lugar de la infracción</b>								
Vía pública	75.3	77.8	82.6	50.0	63.2	50.0	48.1	70.6
Hogar	14.0	12.9	10.9	30.0	28.9	50.0	33.3	21.4
Trabajo	1.3	0.7	0.0	6.0	0.0	0.0	3.7	0.0
Escuela	1.5	1.1	0.0	2.0	0.0	0.0	6.2	0.0
Aeropuerto internacional (aduana)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugar de recreo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	7.9	7.5	6.5	12.0	7.9	0.0	8.6	7.9

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007

**Cuadro C5**


Mortalidad por causas múltiples al consumo de sustancias psicoactivas. Sinaloa, México, 2006

CIE	No de muertes	Tasa por un millón de hab.
10a Rev. Causa		
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol.	97	34.717
F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos.	0	0
F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides.	0	0
F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos.	0	0
F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína.	6	2.147
F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína.	1	0.358
F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos.	0	0
F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco.	77	27.559
F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles.	0	0
F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas.	22	7.874
K70 Enfermedad alcohólica del hígado	41	14.674
X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0	0
X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte.	0	0
X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte.	0	0
X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas.	0	0
Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada.	0	0
Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte, de intención no determinada.	0	0
Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada.	0	0

Fuente: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) 2006, DGE/SSA

**Figura C1**

Tendencias en el consumo de drogas alguna vez en la vida para la población que acude a centros de tratamiento. Sinaloa, México







## Cuadro C8

Tendencias de la droga de inicio en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales, global. Sinaloa, México

Droga inicio	AÑO											
	1994	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alcohol	27.9	30.9	32.7	51.6	29.8	16.3	20.1	27.1	27.6	24.1	27.2	33.2
Mariguana	51.6	43.4	49.1	29.3	26.1	31.0	30.2	30.4	32.1	30.3	32.8	27.4
Inhalables	3.2	0.7	0.0	2.3	0.7	2.0	2.5	2.2	2.3	2.1	1.9	1.9
Alucin	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Heroína	2.1	2.0	0.0	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.3	0.5	0.6	0.5
Cocaína	11.6	13.2	5.5	10.3	13.9	15.2	14.1	11.3	10.2	10.2	10.0	8.8
Tranq	2.6	3.9	3.6	1.7	1.8	1.7	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1
Anfeta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2
Tabaco	0.5	4.6	3.6	1.7	24.4	30.0	28.2	22.7	21.9	26.5	20.2	22.3
Cristal	0.0	0.0	3.6	1.0	1.3	3.0	2.5	3.3	3.6	4.0	5.5	4.2
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio/morf	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
Barbitu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticoli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepre	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.5	0.0	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
Basuco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Rohypnol	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3

## Cuadro C9

Tendencias de la droga de impacto en pacientes que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales global. Sinaloa, México

Droga impacto	AÑO											
	1994	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Alcohol	17.9	16.4	0.0	22.3	7.4	4.4	11.0	14.1	15.3	12.5	14.2	17.3
Mariguana	10.5	12.5	0.0	14.9	12.8	18.7	12.1	12.0	8.6	6.7	7.1	7.5
Inhalables	5.3	3.3	0.0	2.7	0.9	3.0	2.8	1.1	1.4	1.0	0.8	1.0
Alucin	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Heroína	11.6	11.2	66.7	13.7	19.6	14.6	11.9	10.3	9.2	7.5	6.5	6.1
Cocaína	38.9	44.1	0.0	33.8	44.2	38.6	26.5	22.9	19.3	15.3	14.6	14.9
Tranq	13.2	8.6	0.0	1.7	2.0	1.3	2.9	1.8	2.3	1.6	1.2	2.0
Anfeta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Tabaco	1.1	2.6	0.0	0.0	0.9	0.3	0.1	0.1	0.7	3.1	3.7	3.7
Cristal	0.0	0.0	0.0	8.0	9.1	17.3	31.0	35.2	40.0	49.4	49.9	45.3
Crack	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.3	0.2	0.1	1.0	0.7	0.7	0.8
Refractil	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio/morf	0.0	0.7	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
Barbitu	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticoli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepre	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	1.6	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
Basuco	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.7	1.2	1.2	0.8	1.1	0.6	0.4
Rohypnol	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.5	0.2	0.8	0.9	0.5	0.2	0.6

---

Encuesta Nacional de Adicciones 2008  
**Resultados por entidad federativa, Sinaloa**

---

Se terminó de imprimir en junio de 2009.  
La edición consta de 200 ejemplares y estuvo al cuidado  
de la Subdirección de Comunicación Científica  
y Publicaciones del Instituto Nacional de Salud Pública.

